

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación. No almacene por encima de los 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico:** Ácido fosfínico
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
  - En caso del contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
  - Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106  
MONTANA: 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Garrote®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Glufosinate ammonium ..... 200 g/L  
Aditivos ..... csp 1 L

PQUA N°2000-SENASA

Titular de registro:  
MONTANA S.A.

Formulado por:

Lier Chemical Co Ltd  
Economic and technical  
development zone, Mianyang,  
Sichuan province,  
P.R.China.

Importado y Distribuido por:

MONTANA S.A.  
Av. Javier Prado Este N° 6210,  
Ofi. 401, La Molina. Lima - Perú.  
Teléfono: (511) 4193000  
e-mail: info@corpmontana.com  
www.corpmontana.com

Contenido Neto: 1L

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



MONTANA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **GARROTE** es un herbicida de contacto, no selectivo post-emergente, que actúa inhibiendo la enzima glutamina sintetasa, produciendo una alteración del metabolismo del amonio, causando la acumulación fitotóxica dentro de la maleza, y ejerciendo su efecto herbicida.

- Para la aplicación, se realiza una pre-mezcla del producto en un volumen reducido de agua agitando hasta homogenizar la mezcla y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación completando el volumen requerido. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual o accionado por el tractor) y que se encuentre debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | DOSIS       |      | PC | LMR (ppm) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------|
|         | Nombre Común                                                                                                       | Nombre Científico                                                                                                                                                                                                            | L/200L      | L/ha |    |           |
| Maíz    | Yuyo<br>Hierba del gallinazo<br>Chamico<br>Verdolaga<br>Gramma dulce<br>Coquito<br>Pata de gallina<br>Gramma china | <i>Amaranthus hybridus</i><br><i>Chenopodium murale</i><br><i>Datura stramonium</i><br><i>Portulaca oleracea</i><br><i>Cynodon dactylon</i><br><i>Cyperus rotundus</i><br><i>Eleusine indica</i><br><i>Sorghum halepense</i> | 0.75 - 1.25 | -    | 70 | 0.1       |
| Palto   | Yuyo<br>Amor seco<br>Coquito<br>Verdolaga                                                                          | <i>Amaranthus viridis</i><br><i>Bidens pilosa</i><br><i>Cyperus rotundus</i><br><i>Portulaca oleracea</i>                                                                                                                    | -           | 1-2  | 15 | 0.1       |

PC: Periodo de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Las aplicaciones deberán realizarse en forma dirigida y cuando las malezas presenten de 2 a 5 hojas. Es recomendable que el suelo se encuentre a capacidad de campo.
- En el cultivo de maíz realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año. Aplicar máximo: 2.5L/Ha.
- En el cultivo de palto realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año. Respetar un intervalo de aplicación de 30 días.
- Rotar con herbicidas de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD

**GARROTE** no es compatible con productos de reacción alcalina ni fuertemente oxidantes. Antes de realizar la mezcla es recomendable efectuar una confirmación de compatibilidad y miscibilidad o consultar con nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

