

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ADAMA

Tirton®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN: Hidróxido de Cobre : 138.2 g/kg, Cymoxanil 80.0 g/kg, Mancozeb 500 g/kg y Aditivos: c.s.p. 1 Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Inorganic (Copper hydroxyde) + Cyanoacetamide oxime (Cymoxanil) + Dithiocarbamate (Mancozeb).
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)

CICOTOX : 0800- 13-040; INFOSALUD: 0800-10-828; CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE CV.
Carretera a Tecuaititán Km 0.676, San Miguel, Poncitlan, 45977, Jalisco, México



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Tirton es un fungicida sistémico y de contacto, de acción preventiva y curativa que penetra a través de las hojas.

Aplicar dirigido al follaje utilizando equipo de pulverización terrestre, gotas finas y cobertura uniforme. La aplicación debe realizarse en condiciones climáticas favorables. Mantener el agitador en movimiento durante la aspersión. Antes de aplicar realizar calibración de equipos y esperar que el rocío seque.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
PAPA	Rancha (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0	14	- ¹ 0.05 ² 0.2 ³

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Periodo de Carencia
1 hidroxido de cobre , 2 cymoxanil, 3 mancozeb

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña/año para el cultivo de papa, considerando una campaña al año y un intervalo mínimo de 7 días entre aplicaciones. Realizar las aplicaciones, de forma preventiva, entre desarrollo vegetativo hasta termino de floración, cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad, o cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad (no más del 10% de incidencia).

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas, sin equipo de protección, durante 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

En caso de mezcla con otros productos se recomienda, bajo responsabilidad del usuario, realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la muestra a usar. No es compatible con fosetyl-Al, fevalerato, clorpirifos y fertilizantes foliares a base de zinc. Evitar productos que contengan amoniaco o tengan una fuerte reacción ácida.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotoxico en los cultivos y dosis recomendadas. Puede ocurrir fitotoxicidad cuando se mezcla con productos a base de Fosetyl-Al.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

CONTENIDO NETO: 5 Kilogramos

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Dimensiones 350 mm x 220 mm