

TEBUZOLE 250 EW 1L. 28,7x15 cm. COEX

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente irritante a los ojos.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Irritante a las vías respiratorias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y herméticamente cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de manipular el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico Triazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Cuidado. Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos buscar atención médica.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. Carbón activado.
- Teléfonos de emergencia: CICOTOX : 0800-1-3040**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

TEBUZOLE 250 EW[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSION ACEITE EN AGUA - EW

Composición:
Tebuconazole250 g/L
Aditivosc.s.p. 1L

Registro PQUA N° 173 - SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
POINT ANDINA S.A
Calle Loreto MzA6 Lote 15
Urbanización Santa Patricia II Etapa, La Molina. Lima- Perú
Telf. (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:
Point International Ltd.
42 ST. Margarets Grove
Twickenham Tw1 1JG
United Kingdom
Tel. (44-20)8892 3862

Contenido Neto: 500 ml
N° de lote:
Fecha de Form:
Fecha de Venc:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



Moderadamente peligroso
DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TEBUZOLE 250 EW es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles su uso está destinado a campos abiertos de cultivos de espárrago, alcachofa, pimiento y tomate para prevenir y controlar el ataque de roya, oidium y botritis.

TEBUZOLE 250 EW tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo.

Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando las horas de mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS mL / cilindro 200 L	Período de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	150-200	3	0.50
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	150	14	0.05
Pimiento	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	7	0.13
	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	200	7	0.13
Tomate	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	7	0.20
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	100-150	14	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

El número de aplicaciones por campaña pueden ser hasta 5.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TEBUZOLE 250 EW en general se aplica solo con un surfactante.
Se recomienda no mezclar **TEBUZOLE 250 EW** con concentrados emulsionables.

FITOTOXICIDAD

TEBUZOLE 250 EW no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

- Banda - Yellow C
- Marca - Pantone 7481 C
- Pantone 7481 C

- Letras FARMAGRO-Pantone Coll Gray 11C
- Cuadro hombre- Pantone 2995 C
- Cuadro vaca - Pantone 164 C
- Cuadro planta - 7487 C