

TEBUZOLE 250 EW 1L. 28,7x15 cm. COEX

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Moderadamente irritante a los ojos.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Irritante a las vías respiratorias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y herméticamente cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de manipular el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico Triazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Cuidado. Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos buscar atención médica.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. Carbón activado.
- Teléfonos de emergencia: CICOTOX : 0800-1-3040**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# TEBUZOLE 250 EW<sup>®</sup>

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### EMULSION ACEITE EN AGUA - EW

**Composición:**  
 Tebuconazole .....250 g/L  
 Aditivos .....c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 173 - SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
**POINT ANDINA S.A**  
 Calle Loreto MzA6 Lote 15  
 Urbanización Santa Patricia II Etapa, La Molina. Lima- Perú  
 Telf. (01) 348-1018 / 349-9609

**Point**  
 ENTREGAMOS CALIDAD

Formulado por:  
**Point Agro-China Limited**  
 Wan Shi Town,  
 Yixing, Jiangsu, 214217 China  
 Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

**Contenido Neto: 200 L**  
 N° de lote:  
 Fecha de Form:  
 Fecha de Venc:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**



**Moderadamente peligroso  
 DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TEBUZOLE 250 EW** es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles su uso está destinado a campos abiertos de cultivos de espárrago, alcachofa, pimiento y tomate para prevenir y controlar el ataque de roya, oidium y botritis.  
**TEBUZOLE 250 EW** tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo.  
 Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando las horas de mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación.  
 Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS mL / cilindro 200 L	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	150-200	3	0.50
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	150	14	0.05
Pimiento	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	7	0.13
	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	200	7	0.13
Tomate	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	7	0.20
Espárrago	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	100-150	14	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

El número de aplicaciones por campaña pueden ser hasta 5.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**TEBUZOLE 250 EW** en general se aplica solo con un surfactante. Se recomienda no mezclar **TEBUZOLE 250 EW** con concentrados emulsionables.

**FITOTOXICIDAD**

**TEBUZOLE 250 EW** no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



- Banda - Yellow C
- Marca - Pantone 7481 C
- Pantone 7481 C

- Letras FARMAGRO-Pantone Coll Gray 11C
- Cuadro hombre- Pantone 2995 C
- Cuadro vaca - Pantone 164 C
- Cuadro planta - 7487 C