

**LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones del producto.

- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.

- Utilizar ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.

- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Pirimidiniloxibenzoico.

- En caso de intoxicación: Llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa.

- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca por 15 a 20 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica.

- En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Llamar al médico para tratamiento.

- En caso de ingestión, si el paciente está consciente, lavar la boca y dar a beber abundante agua. No inducir al vómito ni administrar nada por la boca si la persona está inconsciente. Contactar a un médico.

- En caso de inhalación, traslade al paciente a un lugar fresco y bien ventilado y mantenerlo en reposo. Nota al médico: No se ha determinado antídoto específico.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 117 ó 0801-10200
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 cm.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fráticas superficiales o en suelos altamente permeables.

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

IDENTIDAD:

Nombre químico(IUPAC):

Sodium-2,6 bis (4,6 - dimethoxyypyrimidin - 2 -yloxy) benzoate


Fórmula empírica:

C₁₉H₁₇N₄NaO₈

Peso Molecular:

452.36 g/mol

Fórmula estructural:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Estado físico : Líquido
Color : Blanquecino
Olor : Prácticamente sin olor
pH : 9.1
Densidad : 1.17g/ml
Inflamabilidad : No inflamable
Explosividad : No explosivo
Corrosividad : No corrosivo
Estabilidad : Estable por dos años en el envase original a temperatura ambiente.

VIPER 40% SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Bispiribac sodio.....400 g/L
Aditivos.....c.s.p.1L

Registro PQUA N° 465 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A-6 Lote 15
Urb. Sta Patricia - La Molina. Lima - Perú
Telf: (01) 348 - 1018/ (01) 349 - 9609

Formulado por: POINT AGRO-CHINA LTD



Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001,
Fax. 8785 1537

CONTENIDO NETO: 100 ml, 250 ml

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



**LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

VIPER 40% SC es un herbicida postemergente perteneciente al grupo de los pirimidiniloxibenzoico, el cual se trasloca en el interior de las malezas inhibiendo la síntesis de aminoácidos, por lo que inhibe su crecimiento y causa la muerte.

VIPER 40% SC se recomienda para el control de malezas gramíneas anuales, ciperáceas y de hoja ancha en el cultivo del arroz; tiene un largo poder residual.

VIPER 40% SC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

VIPER 40% SC se aplica con un equipo aspersor mochila manual o con aspersores montados en tractor. En ambos casos, deben estar previstos de una boquilla tipo abanico.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

VIPER 40% SC es un herbicida cuya aplicación se realiza en la época de crecimiento vegetativo del arroz y post emergente a las malezas. Se efectúa una sola aplicación del producto por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

VIPER 40% SC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZA		Período de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico		
ARROZ	Canastilla	<i>Cyperus difformis</i>	---	0.02
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>		
	Correhuela	<i>Ipomoea sp.</i>		
	Florita, botoncito	<i>Eclipta alba</i>		
	Grana Leche	<i>Echinochloa colonum</i>		
	Leche Leche	<i>Euphorbia hirta</i>		
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crusgalli</i>		
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>		
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		
	Yuyo hembra	<i>Amaranthus hybridus</i>		
	Yuyo macho	<i>Amaranthus spinosus</i>		

LMR: Límite Máximo de Residuos.

VIPER 40% SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Bispiribac sodio.....400 g/L
Aditivos.....c.s.p.1L

Registro PQUA N° 465 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A-6 Lote 15
Urb. Sta Patricia - La Molina. Lima - Perú
Telf: (01) 348 - 1018/ (01) 349 - 9609

Formulado por: POINT AGRO-CHINA LTD



Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001,
Fax. 8785 1537

CONTENIDO NETO: 100 ml, 250 ml

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

