| neoagrum asegura tu cosecha | ETIQUETA<br>BUPROMAX PLUS 500 SC - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED | Revisión: 00<br>Aprobado: JR<br>Fecha: 01-02-2018<br>Página: 1 de 5 |
|---|---|---|

20.7 ± 0.3 cm

0.9 ± 0.2 | 0.9 ± 0.2

7.7 ± 0.3 cm

1.2 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRIMEROS AUXILIOS**
**- Grupo Químico: Tidiasina.**
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**CICOTOX: 0-800-13040**
**ESSALUD EN LINEA: 0800-10-828**
**NEOAGRUM S.A.C.: 01-6176400**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

BUPROMAX® PLUS 500 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

| | |
|---|---|
| Buprofezin | 500 g/L |
| Aditivos | c.s.p.1 L |

**Reg. PQUA Nº 2009 - SENASA**
**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:**
**NEOAGRUM S.A.C.**

**Pj. Camino de Acceso Nº 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla**
**Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400**

**Contenido neto: 250 mL**
F. de Form.:
Nº de Lote: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing
CHINA

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BUPROMAX PLUS® 500 SC** es un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina, que actúa por contacto e ingestión, afectando el proceso de muda lo cual provoca la muerte del insecto eficazmente sobre ninfas de mosca blanca y queresas.

**BUPROMAX PLUS® 500 SC** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, finalmente se agita hasta obtener una mezcla homogénea.
Usar agua limpia. Aplicar temprano en la mañana, para evitar el viento y la deriva a cultivos vecinos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | P.C. | L.M.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | L/200L | (días) | (ppm) |
| Palto | Queresa | *Fiorinia fioriniae* | 0.1 | 21 | 0.3 |
| Vid | Cochinilla | *Planococcus ficus* | 0.1 | 40 | 0.01 |

P.C.: Periodo de carencia. L.M.R.: Límites máximos de residuos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**ENVASE: PEAD**

| LOGO PRODUCTO | LOGO NEOAGRUM | | | TEXTO | B.TOXICOLOGICA | LOGO PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANT. 343 | PANT. 377 | PANT. 1375 | | NEGRO | PANT. 293 C | PANT. 295 C |

**CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE**