

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Cirox[®]

75 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Ciromazina..... 750 g/Kg
Aditivos..... c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° 118 - SENASA



Titular del registro:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima, Perú.

Teléfono: (01) 499-7831



Importado y distribuido por:

HORTUS S.A.

Calle Sucre 270, Ate, Lima, Perú

Telf. (01) 7482717

RUC: 20101637221

RU N°: 141097

Formulado por:

YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

Wanshi Town Yixing City

Jiangsu Province, China 214217

CONTENIDO NETO: 100 g

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante manipuleo y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados, lejos de la luz directa.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Muy tóxico por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Irritante para las vías respiratorias.
- En caso de incendio se generan gases tóxicos y/o irritantes, usar respirador o máscara de protección.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, así como la inhalación del polvo.
- Evitar almacenar a temperaturas superiores a 35°C.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazina
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua limpia. Llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente médico y muéstrele la etiqueta.
- Salpicaduras en la piel y ojos lavarlos rápidamente con abundante agua limpia.
- Nota al médico si el producto ha sido ingerido.
- No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106, INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.: (01) 499-7831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas; no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna, flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o en zonas de napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CIROX 75 PM es un insecticida sistémico regulador del crecimiento que actúa por contacto, interfiriendo el desarrollo normal de los estados inmaduros de *Liriomyza* hidrobrensis afectando la muda y empupamiento.

CIROX 75 PM aplicado sobre la planta tiene actividad translaminar y sistémica, controlando larvas de moscas minadora en los cultivos de papa y alcachofa.

Se recomienda aplicar **CIROX 75 PM** ante la presencia de las primeras minas en las hojas del tercio inferior o a la presencia de adultos.

CIROX 75 PM se emplea diluido en agua, preparar una pre-mezcla distribuyendo la cantidad necesaria del **CIROX 75 PM** en balde. Luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua de aplicación.

CIROX 75 PM puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochila a palanca, a motor. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un monitoreo de cultivo, aplicando de manera uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Puede variar de acuerdo a la incidencia (Monitoreo) del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra. Número máximo de aplicaciones por campaña: 3

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar a las 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: **CIROX 75 PM** es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de reacción neutra

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	21	0.5
Alcachofa			70	7	0.5

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

