

# Superdor *Maxx*<sup>®</sup> 70 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRANULO DISPERSABLE (WG)**

**COMPOSICIÓN:**

Imidacloprid ..... 700 g / Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**  
**CAPEAGRO S.A.C.**



**Importador y  
Distribuidor:**

**CAPEAGRO S.A.C.**  
Av. Benavides 2150. Ofic. 803  
Miraflores - Lima  
[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

**FORMULADO POR:**

**Oasis AgroScience Limited**

Room 1510, NO 500, Xinjian RD, Shanghai  
CHINA

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Fecha de Vencimiento:

Contenido  
Neto: **1 Kg**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

# LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinoides.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleva al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario

Teléfonos de emergencia  
CICOTOX: 0800-13040 - 328-7398 Anexo 4814  
CETOX: 213-2318  
ESSALUD: 0801-10200 - 472-2300  
CAPEAGRO S.A.C.: 01-445-5346

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, aplicar sobre el producto tierra, aserrín o arena. Recoja en un recipiente hermético y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Superdor Maxx 70 WG** es un insecticida sistémico de contacto e ingestión, con efecto inhibidor del sistema nervioso del insecto plaga.

#### - Modo de preparación:

Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada de **Superdor Maxx 70 WG** en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla hasta las 3/4 partes de agua o la mitad, agitar y completar la cantidad de agua recomendada, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea. Agitar el tanque cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al momento de la aparición de la plaga con un máximo de dos aplicaciones/campaña/año.

### PERIODO DE REINGRESO:

El reingreso al área tratada es de 24 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

### COMPATIBILIDAD:

No es conocida alguna incompatibilidad de este producto con otros productos fitosanitarios o fertilizantes. No mezclar con productos de reacción alcalina..

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO   | PLAGA     |                              | DOSIS              |            | PC*<br>(días) | LMR**<br>(ppm) |
|-----------|-----------|------------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|
|           | N. común  | N. Científico                | Kg/200L<br>de agua | Kg/Ha      |               |                |
| Espárrago | "Caracha" | <i>Prodiplaxis longifila</i> | --                 | 0.2 - 0.25 | 21            | 0.05           |

\*P.C.: Periodo de carencia

\*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos

