

“ LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Tóxico por ingestión.
- Peligroso por inhalación, irritante, al tacto y vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratoria.
- Moderadamente irritante a los ojos, causa daños a los ojos, use protección ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase vacío puede utilizarse para almacenar alimentos ni bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo Químico: Estrobilurina.
- En caso de intoxicación por ingestión o inhalación, llamar inmediatamente al médico o llevar al paciente al médico y llevar la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático, no existe antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX Telf.: 0800-1-3040(Atención 24 horas).
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4.
GOLDER SAC: 998128710

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación.
- Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades para tal fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques, arroyos, con los restos de la aplicación, sobrantes o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ZADOS 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables WG

Composición:

Azoxystrobin 500 g/Kg
Aditivos c.s.p 1Kg

Reg. PQUA N°2029- SENASA

Titular de Registro:

GOLDER SAC
Calle Los Tejedores N° 187 Urb. Industrial Vulcano-Ate
Teléfono: 998128710

Formulador:

BETA CHEMICALS
Rm.707, Bk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Importador y Distribuidor:

GOLDER

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar **ZADOS 50 WG** es un fungicida que actúa inhibiendo la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del micelio del hongo. Para la preparación de **ZADOS 50 WG**, llenar hasta la mitad con agua del recipiente de mezcla, verter la dosis recomendada y comenzar agitar hasta tener una mezcla homogénea.

- Asegurarse la aplicación con un volumen de agua que cubra la superficie de la planta. Tomar en cuenta que su equipo de aplicación se encuentre en buenas condiciones.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Pimiento, pprika y aji	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.08	0.2 - 0.24	3	2
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.04	0.2	14	2
Cebolla	Mancha prpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.25 - 0.3	2	10
Alcachofa	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.08	0.2 - 0.25	7	5
Esprrago	Mancha prpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.08 - 0.1	0.20 - 0.25	ND	0.05

P.C: Periodo de carencia

LMR: Lmite Mximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIN

Para una mayor eficiencia, debe ser aplicado de manera preventiva y la observacin de los primeros sntomas de la enfermedad, puede ser aplicado hasta 2 veces por campaa, considerando una campaa por ao.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al rea tratada sin usar equipo de proteccin 24 horas despus de la aplicacin del producto.

COMPATIBILIDAD

ZADOS 50 WG es compatible con la mayora de los plaguicidas usados, sin embargo, se recomienda efectuar una prueba antes de la mezcla definitiva.

FITOTOXICIDAD

ZADOS 50 WG no es fitotxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las caractersticas fsico qumicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqu recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

