

ADAMA

Bumper®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:  
Propiconazole ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:  
ADAMA Agriculture Perú S.A.  
Av. El Derby N° 254 Of 503.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:  
ADAMA Brasil S/A  
R. Pedro Antonio de Souza, 400  
Jd. Eucaliptos-Londrina-PR-Brasil.

Contenido Neto: 4 LITROS  
Lote No.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y hoja informativa.
- Nota al médico: No hay antídoto específico disponible. Realizar tratamiento sintomático y terapia complementaria. En caso de ingestión, hacer un lavado de estómago y utilizar carbono activado.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas): CISPROQUIM: 0800-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Bumper es un fungicida de acción sistémica y buen poder residual, eficaz en el control preventivo y curativo de enfermedades foliares causadas por hongos ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos. Bumper se aplica por aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre. Emplear suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, previa calibración del equipo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO   | ENFERMEDAD               |                            | DOSIS<br>(ml/ha) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común             | Nombre científico          |                  |              |              |
| APIO      | Mancha foliar            | Septoria apicola           | 50               | 14           | 5.0          |
| ARROZ     | Fuego de la vaina foliar | Rhizoctonia oryzae-sativae | 100              | 35           | 7.0          |
| CEBADA    | Roya                     | Puccinia graminis          | 50               | 45           | 2.0          |
| ESPÁRRAGO | Roya                     | Puccinia asparagi          | 100              | 30           | 0.01         |
| PLÁTANO   | Sigatoka negra           | Mycosphaerella fijiensis   | 50               | 1            | 0.1          |
| ROSAL     | Oidiosis                 | Sphaerotheca pannosa rosae | 50               | N.A.         | N.A.         |
| VID       | Oidiosis                 | Erysiphe necator           | 50 - 100         | 35           | 0.3          |

PC: Periodo de Carenia LMR : Limite Máximo de Residuos  
N.A. : No Aplicable

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma. Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña-año, con un intervalo mínimo de 15 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CARA

CONTRACARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm (por cara)  
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa