

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
 Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón,
- Sespues de sosa el producto adrises con administrate agad y judon, cámbiese y lavel a ropa contaminada.
 No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse.
- para conservar alimentos o aqua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

SAMU 106; Adama Agriculture Perú S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
 No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Bumper es un fungicida de acción sistén eficaz en el control preventivo y curativo

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	(ml/ha)	(días)	(ppm)
APIO	Mancha foliar	Septoria apiicola	50	14	5.0
ARROZ	Fuego de la vaina foliar	Rhizoctonia oryzae-sativae	100	35	7.0
CEBADA	Roya	Puccinia graminis	50	45	2.0
ESPÁRRAGO	Roya	Puccinia asparagi	400 - 500	26	0.01
PLÁTANO	Sigatoka negra	Mycosphaerella fijiensis	50	1	0.1
ROSAL	Oidiosis	Sphaerotheca pannosa rosae	50	N.A.	N.A.
VID	Oidiosis	Erysiphe necator	50 - 100	35	0.3

PC: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos N.A.: No Aplicable

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña; considerando una (01) campaña al año en los cultivos de cebada, plátano y vid; dos (02) campañas al año en los cultivos de apio, claveles y rosal con un intervalo mínimo de 15 días entre aplicaciones. En el caso de espárrago, realizar una (01) sola aplicación por campaña, considerando dos (02) campañas al año. Para mayor información ver hoja informativa adjunta

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.





CARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm (por cara) Esta etiqueta requiere Hoja Informativa

CONTRACARA