

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evitar contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No reutilizar el envase vacío.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Cloroacetamida.
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, inmediatamente llame a un Centro de información de venenos o a un doctor para tratamiento. No inducir al vómito. No administre nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- Si se produce el contacto con los ojos mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente con agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, mover a la persona a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua tal acción es esencial para minimizar el contacto con la piel, la ropa contaminada debe lavarse a fondo antes de volverse a usar, si la irritación persiste llamar al médico.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398 BIOAGROCORP TRADING SAC: 370-7251
ESSALUD: 117 (gratuito) CIPROSQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos: algas, plantas acuáticas
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



BUTAKILL 600 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Butachlor 600 g/L
Aditivosc.s.p 1L

Reg. PQUA N° 2032 - SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.

Importado y distribuido por:

BIOAGROCORP TRADING S.A.C



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 402 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 370-7251

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 4 L

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD

N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009

CHINA

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUTAKILL 600 EC es un herbicida selectivo pre-emergente utilizado en el cultivo de arroz para el control de malezas gramíneas, ciperáceas anuales y algunas malezas de hoja ancha.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		Dosis L/Ha	P.C. (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	Moco de pavo Pata de gallina Cadillo Verdolaga Coquito	<i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Cyperus rotundus</i>	4.0	N.A.	0.01

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límites máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar BUTAKILL 600 EC en pre-emergencia de las malezas antes de siembra para un control general y antes de emergencia del cultivo después de siembra o transplante.

Se recomienda hasta un máximo de 1 aplicación por campaña/2 por año.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: BUTAKILL 600 EC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD: BUTAKILL 600 EC no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

