"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Este producto es tóxico si es ingerido.
- -La sustancia causa irritación severa a los oios
- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- -Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- -Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- -Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- -Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- -Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras horas después de la aplicación.
- -Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Phenoxy

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta v la hoia informativa adjunta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si la persona esta consciente, dar de beber abundante aqua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se ha detenido, realizar respiración artificial

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante aqua potable limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.

En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante aqua y jabón. Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 01-713-9960

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.

Entregue o deposite el envase en el lugar de destino

- dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- -Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- -No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- -No contaminar las fuentes de aqua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- -Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- -El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- -En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

PQUA Nº 2039 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C. Av El Polo N°401 Oficina 610

Santiago de Surco, Lima. Perú Teléfono: (511) 713-9960



FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.

Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231 E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com https://www.rainbowagro.com/

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: SOLANDINA PERU S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902 Urb. A. Von Humboldt . Miraflores - Lima - Perú. Teléfono: +51960241693



Contenido Neto: 20 L

Lote No:

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMINESPRAY es un herbicida sistémico, selectivo y post-emergente, que controla malezas de hoja ancha en los cultivos de gramíneas. La muerte de la mayoría de las malezas ocurre en la primera semana, pudiendo tener un efecto residual entre tres a seis semanas.

Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico. La absorción de AMINESPRAY puede ser meiorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis	РС	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha		(ppm)
Caña de azùcar	Amor Seco Chamico Verdolaga Capulí Cimarrón Yuyo Lengua de Vaca	Bidens pilosa Datura stramonium Portulaca oleracea Nicandra physalodes Amaranthus dubius Rumex crispus	1.5-2.0	15	0.05

PC: Periodo de carencia L.M.R: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 01 (una) aplicación por campaña. Aplicar sobre las malezas ióvenes. hasta cuando el cultivo alcance entre 20 y 30 cm de altura.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 12 horas.

COMPATIBIL IDAD

AMINESPRAY es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de sustancias fuertemente oxidantes. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

AMINESPRAY no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa v maneia de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.







































