“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
• Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Ariloxifenoxipropionatos
• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
• En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por la boca.
• En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos teniendo los parpados levantados
• En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
• En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
• Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito) ESSALUD en linea (linea gratuita): 0801-10200- 411- 8000, opción 4 **CAISAC (01) 253-6444**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
• No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
• Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
• El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales o suelos altamente permeables.

Ricesafe

180 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
Cyhalofop Butil Ester ..... 180 g/L
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Registro PQUA No. _____ SENASA

Titular de registro, Importador y Distribuidor:
RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo Nº 401, Oficina 610, Santiago de Surco Lima
www.rainbowchem.com

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

6th floor Gaoxinjisshuchuangye
Centre Shunhua Road 750,
Jinan Shandong China

Rainbow
Innovation Changes Future

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Contenido Neto: 5 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RICESAFE® 180 EC es un herbicida sistémico de aplicación postemergente, que controla malezas gramíneas en el cultivo de arroz. Actúa por la inhibición de la Acetil CoA Carboxilasa y la división celular de las células de la planta Se absorbe rápidamente a través del follaje y se transloca a los tejidos meristemáticos de la planta donde ejerce su acción herbicida. La detención del crecimiento de las malezas comienza a las pocas horas de la aplicación. A los pocos días se observan: clorosis en las hojas y tallos, coloración que va del rojo al morado y necrosis en los puntos de crecimiento.
No posee actividad sobre el suelo.

Modo de aplicación:
Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad de RICESAFE 180 EC a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla mecánica, hidráulica o manualmente.
Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.
Antes de proceder a llenar los equipos es importante asegurarse de que estos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas y en buen estado para evitar posibles fugas de producto..

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/ha	(días)	mg/kg
ARROZ	Pata de gallina Liendre puerco Rabo de zorro Grama blanca Paja mona	*Echinochloa crusgalli* *Echinochloa colonum* *Echinochloa cruspavonis* *Cynodon dactylon* *Leptochloa filiformis*	1.50-1.75*	45	0.1

P.C. Periodo de carencia
L.M.R. Límite máximo de residuos
***Usar la menor dosis cuando se presente baja infestación de las malezas reportadas y la dosis alta cuando se presenten mayores valores de infestación.**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar una sola aplicación de RICESAFE 180 EC por campaña,. Se recomienda aplicar sobre suelo húmedo y bien preparado, Se debe aplicar sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente.
PERIODO DE REINGRESO: Una vaz haya secado la aspersión.
COMPATIBILIDAD
RICESAFE 180 EC solo es compatible con herbicidas pre-emergentes como Pendimetalina, Thiazopir y Oxadiazon para controlar malezas en post-emergencia. No es compatible con herbicidas para control de hojas anchas y ciperáceas como 2,4-D, Ioxinil, Triaclopyr, Bispiribac sodio, Bentazon y Sulfonilureas. La aspersión de RICESAFE 180 EC debe hacerse 7 días antes o 15 días después de aplicar dichosa herbicidas.
FITOTOXICIDAD:
RICESAFE® 180 EC es un herbicida totalmente selectivo al cultivo del arroz teniendo en cuenta que se sigan las recomendaciuones de uso del producto.
RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO