

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Usar ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Almacenar el producto bajo llave, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fosfomell glicina**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrando la etiqueta.
 - En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
 - En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando.
 - En caso de contaminación dérmica remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
 - En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
 - Nota al médico: no tiene antidoto específico, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:
ECOTOX 0-800 - 1-3040 (gratuito)
E3 Salud en línea (línea gratuita) 0801-10200
opción 4



- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y ventílelo solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o sobrantes vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los residuos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o secomencia del producto por el suelo.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



BATAN®

Plagüicida Químico de Uso Agrícola
HERBICIDA AGRICOLA
Concentrado Soluble (SL)

Composición:
Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos..... C.S.P 1 L

Registro POUA N° - SENASA
Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERU S.A.C.
Av. Los Miros 239, Lince, Lima 14, Perú.
Teléfonos: 00 51 - 1 - 222-2795

Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengling Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

Importado y Distribuido por:
PERU FERTIL E.I.R.L.
Carretera Central N° S/N. C.P. La
Esperanza - Amániles - Huancayo - Huancayo
Teléfono: 962960232



Lote N°:
F. de Form.
F. de Venc.
Contenido Neto: 1 L
NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
BATAN® es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el foliole y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis l/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
ESPARRAC	Grana china	Scirpus halimifolius	2	5	0.1
	Coquillo	Cyperus rotundus			
	Grana dulce	Cyperus rotundus			
	Cadillo	Cyperus rotundus			
	Vuyo	Cyperus rotundus			
	Verdialaga	Cyperus rotundus			
	Moco de pavo	Cyperus rotundus			
	Amar seco	Cyperus rotundus			
	Cajipil	Cyperus rotundus			
	Rallo de zorro	Cyperus rotundus			
Pala de arena	Pala de arena	Cyperus rotundus			
	Pala de arena	Cyperus rotundus			

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.

P.C.: Período de Cuidado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

BATAN® debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas estén en activo crecimiento. Aplicar foliamente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

FITOTOXICIDAD:
BATAN® es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.