LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BATAN®

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

GENERIC

Importado y Distribuido por:
PERU FERTIL E.I.R.L.
Carretera Central N° S/N. C.P. La
Esperanza - Amarilis - Huanuco - Huanuco
Teléfono: 962960232

PERÚ FÉRTIL E.I.R.L.

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

Contenido Neto: 20 L

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
BATAN® es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis l/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
ESPARRAGO	Grama china	*Sorghum halepense*	2	5	0.1
	Coquito	*Cyperus rotundus*			
	Grama dulce	*Cynodon dactylon*			
	Cadillo	*Cenchrus echinatus*			
	Yuyo	*Amaranthus dubius*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Moco de pavo	*Echinochloa colonum*			
	Amor seco	*Bidens pilosa*			
	Capuli	*Nicandra physalodes*			
	Rabo de zorro	*Setaria verticillata*			
	Pata de gallina	*Eleusine indica*			

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC:** Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
BATAN® debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

FITOTOXICIDAD:
BATAN® es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO