LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
ESSALUD: 411 8000 Anexo 4, Infosalud: 0800- 10-828
CICOTOX: 0-800-1-3040, 328-7700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BATAN 757 SG, es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, Actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

BATAN 757 SG, debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con otros herbicidas pre emergentes.

FITOTOXICIDAD:

BATAN 757 SG, es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZAS		Dosis Kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
ESPARRAGO	Grama china Coquito Grama dulce Cadillo Yuyo Verdolaga Moco de pavo Amor seco Capulí cimarrón Pega pega Pata de gallina	*Sorghum halepense* *Cyperus rotundus* *Cynodon dactylon* *Cenchrus echinatus* *Amaranthus dubius* *Portulaca oleracea* *Echinochloa crus-galli* *Bidens pilosa* *Nicandra physalodes* *Setaria verticillata* *Eleusine indica*	2	5	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

BATAN® 757SG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

GRANULO SOLUBLE - (SG)

COMPOSICIÓN:

Glyphosate monoammonium salt ..... 757 g/Kg
Aditivos ..... csp 1 Kg

Registro PQUA N° 2047-SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Jr. Los Mirtos 239
Urb. San Eugenio - Lince - Lima - Perú
Teléfono: 00-51-1-222-2795

Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 512, Shidai Square, Nº 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86-574-87301088

GENERIC
your exclusive agrochemical partner

Importado y Distribuido por:
PERU FERTIL E.I.R.L.
Jr. Neon N° 5681 Zona Industrial Infantas,
Los Olivos - Lima - Peru
Teléfono: + 51 - 949 - 845 - 833

PERÚ FÉRTIL

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

CONTENIDO NETO: 4 kg

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO