

PEGA PEGA *Setaria verticillata*

- En el Cuadro 16 observamos que para la primera evaluación (antes de la aplicación) en promedio todos los tratamientos obtuvieron similar promedio del porcentaje de malezas por unidad experimental de *Setaria verticillata*.
- Con respecto a la segunda evaluación (05 días después de la aplicación) del Análisis de Varianza se encontraron diferencias estadísticas significativas para el promedio del porcentaje de malezas por unidad experimental de *Setaria verticillata*. En la prueba de Comparación de Medias de Duncan (Anexo 5.17) observamos que para esta segunda evaluación el testigo sin aplicación presentó un promedio de 8.500 en promedio del porcentaje de malezas presentes por unidad experimental de *Setaria verticillata* perteneciente al grupo A de Duncan. Respecto a los tratamientos con **FASCINATE 280 SL** presentaron diferencias significativas, entre los tratamientos T1, T2, T3 y T4 con 3.500, 3.000, 2.750 y 2.750 en el promedio del porcentaje de malezas presentes por unidad experimental de *Setaria verticillata* perteneciente al grupo B de Duncan.
- Con respecto a la tercera evaluación (15 días después de la aplicación) del Análisis de Varianza se encontraron diferencias estadísticas significativas para el promedio del porcentaje de malezas por unidad experimental de *Setaria verticillata*. En la prueba de Comparación de Medias de Duncan (Anexo 5.17) observamos que para esta tercera evaluación el testigo sin aplicación presentó un promedio de 12.750 en promedio del porcentaje de malezas presentes por unidad experimental de *Setaria verticillata* perteneciente al grupo A de Duncan. Respecto a los tratamientos con **FASCINATE 280 SL** presentaron diferencias significativas, entre el tratamiento T1 con 2.750 en el promedio del porcentaje de malezas presentes por unidad experimental de *Setaria verticillata* perteneciente al grupo B de Duncan. Respecto a los tratamientos con **FASCINATE 280 SL** presentaron diferencias significativas entre los tratamientos T2, T3 y T4 con 0.500, 0.250 y 0.000 respectivamente en promedio del porcentaje de malezas presentes por unidad experimental de *Setaria verticillata* perteneciente al grupo C de Duncan.
- Con respecto a la cuarta evaluación (30 días después de la aplicación) del Análisis de Varianza se encontraron diferencias estadísticas significativas para el promedio del porcentaje de malezas por unidad experimental de *Setaria verticillata*. En la prueba de Comparación de Medias de Duncan (Anexo 5.17) observamos que para esta cuarta evaluación el testigo sin aplicación presentó un promedio de 15.250 en promedio del porcentaje de malezas presentes por unidad experimental de *Setaria verticillata* perteneciente al grupo A de Duncan. Respecto a los tratamientos con **FASCINATE 280 SL** presentaron diferencias significativas, entre el tratamiento T1 con 3.750 en el promedio del porcentaje de malezas presentes por unidad experimental de *Setaria verticillata* perteneciente al grupo B de Duncan. Respecto a los tratamientos con **FASCINATE 280 SL** presentaron diferencias significativas entre los tratamientos T2, T3 y T4 con 1.750, 1.250 y 1.000 respectivamente en promedio del porcentaje de malezas presentes por unidad experimental de *Setaria verticillata* perteneciente al grupo C de Duncan.