

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspiración).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Phosphonic acid.
- En caso de intoxicación, llámé al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, NO INDUCIR EL VÓMITO. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. Consequir asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cubriendo que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 /Teléf. del titular: (01) 611-0831 / CISPQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

FASCINATE®

280 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glufosinato de amonio ..... 280 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2050 - SENASA

Titular de Registro:

UPL PERÚ S.A.C.  
Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Fnd. Oyague  
Jesús María, Lima - Perú.  
Teléfono (01) 611-0831

Formulador:

UPL LIMITED  
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West),  
Mumbai (Bombay) 400 052, India Tel. 91-22-2646 8000  
Fax 91-22-2604 100 www.uplonline.com

Importador y Distribuidor:

PROCAMPO S.A.  
Calle Salvador Carmona 216,  
Urb. Vulcano - Ate - Lima

Fecha de formulación:

No. de Lote:  
CONTENIDO NETO: 1 L  
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO  
© Marca registrada

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FASCINATE® 280 SL es un herbicida de contacto no selectivo, con alguna acción sistémica, post-emergente, para ser aplicado en bandas, dirigido a malezas. Se transloca solamente en las hojas desde la base hacia el ápice. Controla malezas anuales y perennes. FASCINATE® 280 SL al inhibir la enzima glutamina sintetasa, evita la asimilación primaria del amoníaco, detiene la función catalizadora en la reacción de glutamato a glutamina, entre otras interferencias metabólicas, deteniendo las funciones de la membrana y dañando el aparato fotosintético.

FASCINATE® 280 SL se aplica por aspersión foliar dirigida previa dilución del producto en agua. Puede aplicarse con bomba de espalda, siendo recomendable usar boquillas de abanico plano y un tamaño de gota de 400 µm aproximadamente.

En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo          | Malezas                                                        |                                                                                                                                            | Dosis<br>L/Ha | P.C. | L.M.R. |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|
|                  | Nombre común                                                   | Nombre científico                                                                                                                          |               |      |        |
| Palto            | Amor seco, Grama dulce, Lechera, Pata de gallina, Pega pega    | <i>Bidens pilosa</i> L., <i>Cynodon dactylon</i> L., <i>Euphorbia hirta</i> L., <i>Eleusine indica</i> L., <i>Setaria verticillata</i> L.  | 1.0 - 1.5     | N.A. | 0.10   |
| Vid              | Amor seco, Hierba de gallinazo, Lechera, Pata de gallina, Yuyo | <i>Bidens pilosa</i> L., <i>Chenopodium murale</i> L., <i>Euphorbia hirta</i> L., <i>Eleusine indica</i> L., <i>Amaranthus hybridus</i> L. | 0.8-1.2       | 9    | 0.15   |
| Mandarina        | Pata de gallina, Verdolaga, Pega pega                          | <i>Eleusine indica</i> , <i>Portulaca oleraceae</i> , <i>Setaria verticillata</i>                                                          | 1.00-1.25     | 14   | 0.3    |
| Caña de azúcar   | Gramma dulce, Pata de gallina, Caminadora                      | <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Rotibolalia cochinchinensis</i>                                                      | 1.00-1.25     | N.A. | 0.1    |
| Espárrago        | Gramma dulce, Pata de gallina, Capulí cimarrón                 | <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Nicandra physalodes</i>                                                              | 1.00-1.25     | N.A. | 0.4    |
| Mango            | Pata de gallina, Grama dulce, Amor seco                        | <i>Eleusine indica</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Bidens pilosa</i>                                                                    | 1.00-1.25     | 14   | 0.1    |
| Palma aceitera   | Correhuela, Commelina, Cogollo                                 | <i>Ipomoea</i> sp., <i>Commelina rufipes</i> , <i>Cyperus laxus</i>                                                                        | 1.25-1.50     | 14   | 0.5    |
| Bordos y canales | Gramma dulce, Espartillo, Albahaca silvestre, Capulí cimarrón  | <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Sporobolus indicus</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Nicandra physalodes</i>                             | 1.25-1.50     | N.A. | N.A.   |
| Café             | Oreja de ratón, Rabo de zorro, Amor seco                       | <i>Commelina diffusa</i> , <i>Leptochloa fusca</i> , <i>Bidens pilosa</i>                                                                  | 1.25-1.50     | 20   | 0.1    |

P.C. Periodo de carencia en días

L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm

N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar el producto cuando la plaga esté presente. Aplique una o dos veces por campaña al año en post-emergencia en forma dirigida cuando las malezas estén en crecimiento activo, dentro de un programa de rotación de plaguicidas con diferente mecanismo de acción, para evitar la resistencia.

- Para el cultivo de Palto y Vid, se recomienda un intervalo de aplicación de 90 días.
- Para el cultivo de Mandarina, se recomienda un intervalo de aplicación de 60 días.
- Para el cultivo de Caña de azúcar, Espárrago, Mango y Palma aceitera se recomienda 1 aplicación por campaña/año.
- En Bordos y Canales y al cultivo de café, se recomienda 1 aplicación por campaña al momento que se presenten malezas.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Evite mezclas con agentes fuertemente oxidantes, ácidos o básicos. Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos se recomienda realizar pruebas previas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

