"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Phosphonic acid.
- En caso de intoxicación, llamé al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, NO INDUCIR EL VÓMITO. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. Conseguir asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Teléf. del titular: (01) 611-0831
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

FASCINATE®

280 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:
Glufosinato de amonio ..... 280 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2050 - SENASA

Titular de Registro:
UPL PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Fnd. Oyague
Jesús María, Lima - Perú.
Teléfono (01) 611-0831

Formulador:
UPL LIMITED
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road,
khar (West),Mumbai (Bombay) 400 052,
India Tel. 91-22-2646 8000
Fax 91-22-2604 100 www.uplonline.com

Importador y Distribuidor:
PROCAMPO S.A.
Calle Salvador Carmona 216,
Urb. Vulcano - Ate - Lima

Fecha de formulación:
No. de Lote:
CONTENIDO NETO: 200 L
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FASCINATE® 280 SL es un herbicida de contacto no selectivo, con alguna acción sistémica, post-emergente, para ser aplicado en bandas, dirigido a malezas. Se transloca solamente en las hojas desde la base hacia el ápice. Controla malezas anuales y perennes. **FASCINATE® 280 SL** al inhibir la enzima glutamina sintetasa, evita la asimilación primaria del amoniaco, detiene la función catalizadora en la reacción de glutamato a glutamina, entre otras interferencias metabólicas, deteriorando las funciones de la membrana y dañando el aparato fotosintético.
FASCINATE® 280 SL se aplica por aspersión foliar dirigida previa dilución del producto en agua. Puede aplicarse con bomba de espalda, siendo recomendable usar boquillas de abanico plano y un tamaño de gota de 400 µm aproximadamente.
En caso utilice un surfactante no iónico, añadalo de último y vuelva a agitar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Malezas		Dosis L/Ha	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Palto	Amor seco Grama dulce Lechera Pata de gallina Pega pega	*Bidens pilosa L.* *Cynodon dactylon L.* *Euphorbia hirta L.* *Eleusine indica L.* *Setaria verticillata L.*	1.0 - 1.5	N.A.	0.10
Vid	Amor seco Hierba de gallinazo Lechera Pata de gallina Yuyo	*Bidens pilosa L.* *Chenopodium murale L.* *Euphorbia hirta L.* *Eleusine indica L.* *Amaranthus hybridus L.*	0.8 - 1.2	9	0.15
Mandarina	Pata de gallina Verdolaga Pega pega	*Eleusine indica* *Portulaca oleracea* *Setaria verticillata*	1.00 - 1.25	14	0.3
Caña de azúcar	Grama dulce Pata de gallina Caminadora	*Cynodon dactylon* *Eleusine indica* *Rottboellia cochinchinensis*	1.00 - 1.25	N.A.	0.1
Espárrago	Grama dulce Pata de gallina Capulí cimarrón	*Cynodon dactylon* *Eleusine indica* *Nicandra physalodes*	1.00 - 1.25	N.A.	0.4
Mango	Pata de gallina Grama dulce Amor seco	*Eleusine indica* *Cynodon dactylon* *Bidens pilosa*	1.00 - 1.25	14	0.1
Palma aceitera	Correhuela Commelina Coquito	*Ipomoea sp.* *Commelina rufipes* *Cyperus laxus*	1.25 - 1.50	14	0.5
Bordos y Canales	Grama dulce Espartillo Albahaca silvestre Capulí cimarrón	*Cynodon dactylon* *Sporobolus indicus* *Galinsoga parviflora* *Nycandra physalodes*	1.25 - 1.50	N.A.	N.A.
Café	Oreja de ratón Rabo de zorro Amor seco	*Commelina diffusa* *Leptochloa fusca* *Bidens pilosa*	1.25 - 1.50	20	0.1

P.C. Periodo de carencia en días L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar el producto cuando la plaga esté presente. Aplique una o dos veces por campaña al año en post-emergencia en forma dirigida cuando las malezas estén en crecimiento activo, dentro de un programa de rotación de plaguicidas con diferente mecanismo de acción, para evitar la resistencia.

- Para el cultivo de Palto y Vid, se recomienda un intervalo de aplicación de 90 días.
- Para el cultivo de Mandarina, se recomienda un intervalo de aplicación de 60 días.
- Para el cultivo de Caña de azúcar, Espárrago, Mango y Palma aceitera se recomienda 1 aplicación por campaña al año.
- En Bordos y Canales y al cultivo de café, se recomienda 1 aplicación por campaña al momento que se presenten malezas.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.
COMPATIBILIDAD: Evite mezclas con agentes fuertemente oxidantes, ácidos o básicos. Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos se recomienda realizar pruebas previas.
RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ET. PQUA No. 2050-SENASAV016-200L

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO