

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- "ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO POR PERSONAS QUE MANTENGAN TRATAMIENTO PARA EPILEPSIA, ESPECIALMENTE CON FENOBARBITAL"
- "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas"
- "Causa irritación moderada a los ojos"
- "Evite contacto con la piel y la ropa"
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó
ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Peligroso para los peces, no contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes y envases vacíos del producto".
- "Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre".
- "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin"

DK-ZEB 80 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:
Mancozeb..... 800 g/kg
- Aditivos..... 200 g/kg

Reg. PQUA Nº 011-SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.**

Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar
Telf.: 501-1000 Fax: 262-8403

FABRICADO Y FORMULADO POR:

AGRIA S.A. Asenovgradsko shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria
Teléfono (+359 32) 63 83 69
Fax: (+359 32) 63 83 77

DROKASA
P E R U

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.**

CONTENIDO NETO: 25 Kilos

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK ZEB 80 PM, es un fungicida a base de Mancozeb usado para prevenir el ataque de *Botrytis cinerea* en el cultivo de tomate, *Cercospora asparagi* en el cultivo de espárrago y *Phytophthora infestans* en el cultivo de papa.

Actúa por contacto, inhibiendo los grupos sulfidricos (SH) de los aminoácidos, proteínas y enzimas de las células de los patógenos.

DK ZEB 80 PM, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200 L		
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5 - 0.7	5	5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	-	0.75	ND	0.1
Papa	Hielo o Rancha	<i>Puccinia asparagi</i>	2.5 - 3.0	-	ND	0.1
Holantao	Podredumbre gris	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0 - 1.2	0.5 - 0.6	14	0.1
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5 - 0.6	ND	ND
			-	0.5 - 0.6	21	7

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

ND: No determinado

* La dosis mínima corresponde a aplicaciones preventivas en plantas tiernas. En plantas desarrolladas y cuando la presión de la enfermedad es alta, usar las dosis altas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones / campaña / año, en periodos de 7-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado fenológico del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DK ZEB 80 PM, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

