

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FLUTRILAC 125 SC es un fungicida del grupo de los triazoles, que se caracteriza por su excelente sistemicidad en la planta. Se absorbe desde la superficie, se transloca en sentido acropetal en el xilema y no se acumula en el silo de entrada.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos y dosis:

CULTIVO	Plagas		Dosis	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/Ha	
Esparago	"Roya"	Puccinia asparagi	0.50	21

LMR Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carenia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 1 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FLUTRIFOL 126 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

FLUTRIFOL 126 SC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

FLUTRILAC 125 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Flutriafol

Activos

125 g/L
c.s.p 1 L

Registro PQUA N°

- SENASA

Titular importado por: AGROLAC ANDINA E.I.R.L.

Jr. Yauli N° 1654 - Of. 103 Lima - Perú.

Teléfonos: 425-6487 / 261-5227.

Formulado por: AGROLAC S.A.

Av. De los Venos 9 - 13. Esc. A 6 2ª 08917 BADALONA

BARCELONA - ESPAÑA

Tel.: 93 201 12 22 Fax: 93 209 58 97

Importado y distribuido por: AGROLAC ANDINA E.I.R.L.

Jr. Yauli N° 1654 - Of. 103 Lima - Perú.

Tel.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Nombre comercial del producto:

FLUTRILAC125 SC

Nombre común: Flutriafol

Clase: Fungicida Agrícola

Reg PQUA N°: - SENASA

Composición Química:


Flutriafol 125 g/L
aditivos c.s.p 1 L

Formula empírica:

$C_{10}H_7F_2N_3O$

Peso Molecular: 301.29 g/mol

Formula estructural:



Presentación del producto:

Envases de 250 ml, 500 ml, 1, 5, 10 L, 20 L, 200 L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la expansión.
- Este producto es un irritante dérmico moderado, dañino por contacto con la piel, evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación (guantes largos, mascarera de respiración con filtro de cartucho, capucha impermeables y gafas de seguridad) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cambie y lave la ropa contaminada y báñese con agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazole

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, durante 15 minutos, cuidando los párpados estén lavados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada vía oral, mantener la respiración.
 - En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladar a la zona más fresca. Tratar la respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento sintomático y de soporte.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX 0-800 - 1-3040 (gratuito)
ESSALUD en línea (línea gratuita), 0801-10200,
AGROLAC ANDINA E.I.R.L. 01 425-6487, 01 261-5227.

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en la tarde. Evitar la deriva por el viento.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

