



# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la expansión.
- Este producto es un irritante dérmico moderado. Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Evite el contacto temporal a los ojos.
- Después de usar el producto cambie la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Evite el contacto con el contenido plaguicida. Evite el contacto con alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cambie la ropa contaminada y lávese con agua y jabón.
- Almacene en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.
- No abra el envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta NODENE SÓLO AL INTOXICADO.
- En caso de contacto con los ojos: lávelos con abundante agua, durante 15 minutos, cubriendo los párpados.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa y zapatos contaminados y lávese la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladar a la persona a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTEX: 0-800-1-3040 (gratuito)  
ESSALUD en línea (línea gratuita): 0801-10200.  
AGROLAC ANDINA E.I.R.L. 01 425-6487, 01 261-5227



- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice tirándolo y/o perforándolo, y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Reutilice obligatoriamente el tipo frasco del presente envase.
- Devuelva el envase vacío al punto de acopio.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligro para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No aplicar una tanda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Continuar la limpieza de agua con los restos de la aplicación o sobranos del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



# FLUTRILAC 125 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA [FUNGICIDA AGRÍCOLA] Suspensión Concentrada (SC)

Composición química  
Flutriafol 125 g/L  
Aditivos CSP 1 L

Registro PAQU N° - SENASA

Titular de Registro: AGROLAC ANDINA E.I.R.L.  
Jr. Yauli N° 1654 - Of. 103 Lima - Perú  
Teléfono: 425-6487 / 261-5227

Formulado por: SIMON CORPORATION  
23 Sec. 1, Mei Chuan W. Rd. Taichung 40357 P.R.C. China.  
Tel: 086-4-2693-3841 / FAX: 86-4-2693-37-15

Importado y distribuido por: AGROLAC ANDINA E.I.R.L.  
Jr. Yauli N° 1654 - Of. 103 Lima - Perú  
Tel: +51(01) 425-6487, 261-5227

Contenido Neto: 1 L.

Lote N°:  
F. de Form.  
F. de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligro para abejas.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se venifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los aplicadores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de abejas.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FLUTRILAC 125 SC es un fungicida del grupo de los triazoles, que se caracteriza por su excelente sistemicidad en la planta. Se absorbe desde la superficie, se translocan en sentido acropetal en el xilema y no se acumula en el sitio de entrada.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

## Cuadro de usos:

| CULTIVO | Plagas       |                    | Dosis<br>L/ha | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
|         | Nombre común | Nombre técnico     |               |              |              |
| Esquemo | Roya         | Fluconil aspartato | 0.50          | 21           | 0.05         |

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Carencia

## FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 1 aplicación/campaña, considerando 2 campañas/año.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

FLUTRILAC 125 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

## FITOTOXICIDAD:

FLUTRILAC 125 SC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que las eficaz aquí recomendados. Si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

