

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO • Este producto es dañino, no ingerir. • Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Utilice ropa protectora durante el manejo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS • Grupo Químico: Neonicotenoide (Thiametoxam) y Piretroide (Lambda-cyhalothrin) • En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. • En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien levantados. • Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirar la ropa y calzado contaminado. • En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. • Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. • En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 CISPQUIM: 0800-50847
CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 4118000 ANEXO 4 INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar de destino por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

• Tóxico para las abejas y artrópodos beneficios. • Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. • Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Thiametoxam 141 g/L
Lambda – cyhalothrin 106 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 2052 - SENASA Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China
Oficina Central: 21 Jiangxia St., 315000 Ningbo, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

Lote N°:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: 0.25L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BINOMIO es una mezcla de dos insecticidas de diferentes modos de acción: Thiametoxam, que actúa en el sistema nervioso de los insectos y Lambda-cyhalotrina que actúa por contacto e ingestión. Ambos para el control de trips en el cultivo de cebolla.

• Aplicar **BINOMIO** en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadores manuales, mecánicos o accionados por tractor.
• Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	PLAGAS		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1 - 0.125	14	0.1
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	0.25	14	0.07* 0.02*

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm. *Thiamethoxam **Lambda-Cyhalothrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando dos campañas por año para el cultivo de cebolla.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

