

18.00 cm

NISSORUN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable - WP

COMPOSICIÓN

Hexythiazox.....100 g/Kg
Aditivos.....c.s.p 1Kg

Reg. N° 062-96-AG-SENASA

Titular del registro, importador y distribuidor:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU.

Av. José Pardo N° 513 Of. 701 Miraflores, Lima 18 Perú.

Tel.: (511) 242-7991

Formulado por:

NIPPON SODA CO. LTD

2-1-2 Chome. Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo 100-8165. Japón.

© Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

18.00 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación o manipuleo.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes y máscara protectora.
- En caso de salpicaduras a los ojos, lavarlos bien con agua. Ver primeros auxilios. Hacer uso de guantes protectores. Si les cae producto en la piel, lavarse bien. Si cae en la ropa, cambiarse y lavarla inmediatamente.
- Durante la aplicación, evitar el contacto directo con el producto.
- Después de la aplicación, en caso de haber estado en contacto con el producto, bañarse con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- Conservar el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Thiazolidinones
- En caso de ingestión accidental NO inducir al vómito, no de beber ningún tipo de líquido a una persona que está inconsciente. Consultar al médico.
- Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.
- Contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático (descontaminar funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-13040 (Línea gratuita) O
ESSALUD: 423-7600 (Línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del envase, inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta.
- No desheche las aguas de lavado, residuos y empaques VACÍOS en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Evite el uso de este producto en áreas de cultivo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- No contamine las fuentes de agua, lagos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.

NISSORUN® es un acaricida con una excelente y prolongada actividad ovicida, larvicia y rinitida.

NISSORUN® posee una excelente acción translinar, cuando es aplicado directamente sobre los huevos, éstos no eclosionarán. Si los ácaros adultos sin tratar se mueven hacia las hojas pulverizadas y se produce la oviposición, los huevos no eclosionarán. Si los ácaros adultos asperjados ovipositan en otras hojas, tampoco los huevos eclosionarán. También morirán las ninfas y larvas asperjadas o que entran en contacto con las hojas pulverizadas.

Preparación y aplicación

NISSORUN® se aplica disuelto en agua, se llena un tercio del depósito a usar, se agrega la cantidad de NISSORUN® y se completa la capacidad del recipiente. Después de una ligera agitación se llena una suspensión estable.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar máximo una aplicación por campaña. NISSORUN® se debe aplicar cuando aparezcan las primeras formas móviles. Cuando la presencia de ácaros sea numerosa mezclarlo o alternarlo con acaricida adulticida.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

NISSORUN® es compatible con la mayoría de los plaguicidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

* El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas*

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMUN	PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS Kg/200 L	L.M.R. (ppm)	P.C. días
Algodón	"Araña roja"		<i>Paratyphus paratyphus</i>	0.10 - 0.16		
Arroz	"Araña binateada"		<i>Paratyphus cambarinus</i>	0.10 - 0.16		
Mandarina	"Araña roja"		<i>Paratyphus citri</i>	0.10 - 0.16	0.05	7
Naranja dulce	"Araña roja"		<i>Paratyphus citri</i>	0.10 - 0.16		
Manzana	"Araña binateada"		<i>Paratyphus telarus</i>	0.10 - 0.16		
Frijol	"Araña roja"		<i>Paratyphus cambarinus</i>	0.10 - 0.16		
Mangold	"Araña roja"		<i>Paratyphus sp.</i>	0.10 - 0.16		
Vid	"Araña roja"		<i>Paratyphus urticae</i>	0.10	1.0	28

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos



000039