

14.00 cm

14.00 cm

NISSORUN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable - WP

COMPOSICIÓN

Hexythiazox.....100 g/Kg
Aditivos.....c.s.p 1Kg

Reg. N° 062-96-AG-SENASA

Titular del registro, importador y distribuidor:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU.

Av. José Pardo N° 513 Of. 701 Miraflores, Lima 18 Perú.

Tel.: (511) 242-7991

Formulado por:

NIPPON SODA CO. LTD

2-1-2 Chome. Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo 100-8165. Japón.

Contenido Neto : 80 Kg
Numero de Lote :
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento :

© Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Conserve el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
• El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
• No comer, beber, ni fumar durante la aplicación o manipuleo.
• Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes y máscara protectora.
• En caso de salpicaduras a los ojos, lavarlos bien con agua. Ver primeros auxilios. Hacer uso de guantes protectores. Si les cae producto en la piel, lavarse bien. Si cae en la ropa, cambiarse y lavarla inmediatamente.
• Durante la aplicación, evitar el contacto directo con el producto.
• Después de la aplicación, en caso de haber estado en contacto con el producto, así como después de toda aplicación se recomienda lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa antes de volver a usarla.
• Usar solamente el producto que viene en el envase original.
• Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS
• Grupo químico: Thiazolidinones
• En caso de ingestión accidental NO inducir al vómito, no de beber ningún tipo de líquido a una persona que esta inconsciente. Consultar al médico.
• Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.
• Contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.
• Nota al médico: Tratamiento sintomático (descontaminar funciones vitales), no es conocido ningún antidoto específico.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
NISSORUN® se aplica disuelto en agua, se llena un tercio del depósito a usar, se agrega la cantidad de NISSORUN® y se completa la capacidad del recipiente. Después de una ligera agitación se llena una suspensión estable.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda realizar máximo una aplicación por campaña. NISSORUN® se debe aplicar cuando aparezcan las primeras formas móviles. Cuando la presencia de ácaros sea numerosa mezclarlo o alternarlo con acaricida adulticida.

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
NISSORUN® es compatible con la mayoría de los plaguicidas.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
• El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
• Después de usar el contenido del envase, inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
• No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta.
• No deseché las aguas de lavado, residuos y empaques VACÍOS en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• En las zonas de riego, recoja el producto y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
• No contamine las fuentes de agua, lagos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMUN	PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS Kg/200 L	L.M.R. (ppm)	P.C. días
Algodón	"Araña roja"	Panonychus parvulus	Panonychus parvulus	0.10 - 0.16		
Ajo	"Araña binazulada"	Tetranychus bimaculatus	Tetranychus bimaculatus	0.10 - 0.16		
Mandarina	"Araña roja"	Panonychus citi	Panonychus citi	0.10 - 0.16	0.05	7
Naranja dulce	"Araña roja"	Panonychus citi	Panonychus citi	0.10 - 0.16		
Manzana	"Araña roja"	Tetranychus bimaculatus	Tetranychus bimaculatus	0.10 - 0.16		
Frijol	"Araña binazulada"	Tetranychus bimaculatus	Tetranychus bimaculatus	0.10 - 0.16		
Mangold	"Araña roja"	Paratetranychus sp.	Paratetranychus sp.	0.10 - 0.16		
Vid	"Araña roja"	Tetranychus urticae	Tetranychus urticae	0.10	1.0	28

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

21.00 cm

2.20 cm

000040