

12.30 cm

23.40 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

##### - Grupo químico: TRIAZOL + ESTROBILURINA

- En caso de intoxicación, lleve al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta y/o la hoja de seguridad del producto.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 328 - 7398 / 0800-1-3040  
ESSALUD: 411-8000 (opción 4) / 0800-10-828  
SHARDA PERU SAC: 222-2695

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilice y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicaciones o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# DINAMO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPOEMULSIÓN (SE)

#### Composición:

Epoxiconazole.....50 g/L  
Pyraclostrobin.....133 g/L  
Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° 2059 - SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU SAC**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Formulado por:  
**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
Prime Business Park, Dashrathlaj  
Joshi Road, Vile Parle (W), Mumbai-  
400056, India  
Teléfono: +91 22 5678 2800  
Fax: +91 22 5678 2828

Importado y distribuido por:

**AGRITOP S.A.C.**  
Av. Los Gorriónes 130 - Chorrillos  
Lima - Perú  
Teléfono: 719-1717 / 719-1718

Contenido Neto: 500ml

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Es un fungicida sistémico compuesto de Epoxiconazole y Pyraclostrobin. Ambos producen inhibición de la biosíntesis del ergosterol y las síntesis de ATP, ambos procesos esenciales para el desarrollo del hongo.

**DINAMO** Aplicar con equipos convencionales. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO   | Plaga            |                               | DOSIS<br>L/Ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)                        |
|-----------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|
|           | Nombre Común     | Nombre Científico             |               |                |                                        |
| Espárrago | "Mancha púrpura" | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.5           | 40             | <sup>1</sup> 0.05<br><sup>2</sup> 0.02 |

L.M.R. = Límite máximo de residuos

<sup>1</sup>Epoxiconazole

<sup>2</sup>Pyraclostrobin

PC = periodo de carencia

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **DINAMO** (i.e. Pyraclostrobin + Epoxiconazole) una aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas al año.

**DINAMO** debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.

#### PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

**DINAMO** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común, pero no es compatible con productos de marcada reacción alcalina (por ejemplo, el Polisulfuro de calcio). Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD:

**DINAMO** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

