

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPO - TEBU 250 EC, es un fungicida triazol, sistémico y de amplio espectro; con acción protectora, curativa y erradicante. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de la hoja.

CAMPO - TEBU 250 EC, es utilizado en aplicaciones foliares, para el control de enfermedades como roya en espárrago.

CAMPO - TEBU 250 EC, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol es decir la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo.

CAMPO - TEBU 250 EC, se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	E N F E R M E D A D		DOSIS L/Ha	Periodo de Carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
ESPARRAGO	“Roya”	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5	40	0.5

LMR: Límite Máximo Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

No se ha reportado algún tipo de incompatibilidad con pesticidas. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CAMPO - TEBU 250 EW

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrada Emulsionable (EC)

Composición:

Tebuconazole.....250 g/L
Aditivoscsp 1 L

Registro PQUA N° 2063 - SENASA

Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.

Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

Importado y Distribuido por:

CORPORACION GREEN VALLEY

Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I.

Pro 9no Sector Lima - Lima -

San Martín de Porres

Teléfono: 953560949

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Nombre comercial del producto:

CAMPO - TEBU 250 EW

Nombre común: tebuconazole

Clase: Fungicida Agrícola

Reg PQUA N°: 2063 - SENASA

Composición Química:


Tebuconazol..... 250 g/L

aditivos c.s.p 1 L

Formula empírica: C16H22ClN3O

Peso Molecular: 307,82 g/mol

Formula estructural:



Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido

Color: blanco

Olor: no olor particular

Densidad: 1.10 ± 0.05 g/ml a 20°C

pH: 5.6

Persistencia a la espuma: Max. 25 ml después de 1 minuto

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

Información relativa a la Seguridad

Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Organofosforado

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa, no deje solo al intoxicado.
- En caso de intoxicación por inhalación; mover a la persona al aire libre. Si respira con dificultad suministre oxígeno.
- En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión del producto, administrar mediana cantidad de agua solo si el paciente está conciente pero no provocar el vómito. Consultar con el médico.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: la atropina sola por inyección es un antídoto.

Centro de emergencias de ESSALUD: 117 (Gratuito)/ 0801-10200
CISPROQUIM: 0800 - 50 - 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

