

"MANTÉNGASE BAJO LA VELA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

GLADIADOR
PLUS^{700WG}

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

	700 g/kg	C.S.p. 1 kg
Acetamidrid		
Aditivis		

Req. PQUA N° 2069 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 1 kg

Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:

SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

3.9 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DANINO. No ingerir.
Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conserve el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas,
bebidas ni forrajes.
- Ulice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al
area traida en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Después de usar el producto cavieste, lave la ropa contaminada y bátese
con abundante agua.
- Evite que los niños jueguen en el área tratada.
No permitir que los animales coman o beban de la zona tratada.
No permitir que los animales comen o beban de la zona tratada.
No permitir que los animales comen o beban de la zona tratada.
- Realice la aplicación siguiendo el orden del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neurotóxicos.**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, lavar la boca con agua abundante y dar a beber un vaso de agua si la persona es consciente y puede tragar.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cubriendo los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y lavado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: vino producido tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 105

NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400

MANEJO Y DE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y

ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa conteniendo. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y arrojados benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOBS kg/20L	P.C. (dias)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Ajo	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.05	1	2
	Pojo Harinoso	<i>Pseudococcus gossypinus</i>	0.05 - 0.075	1	2
Ajo	Mosca blanca	<i>Aluridius albipes</i>	0.05 - 0.1	1	2
	Maquila de las bróles	<i>Protophila ingolia</i>	0.075 - 0.1	1	0.8
Espartero	Tripa	<i>Tripsa tabaci</i>	0.05 - 0.1	14	0.05
Fresa	Cochinilla harinosa	<i>Pinnococcus fuscus</i>	0.075 - 0.1	90	0.01
Granado	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.03 - 0.05	14	1
Limon	Quersa coma	<i>Lepidosaphes becki</i>	0.1	14	1
Mandarina	Escama del mango	<i>Matsucoccus mangiferae</i>	0.05 - 0.07	1	0.5
Mango	Quersa	<i>Paratetranychus</i>	0.05 - 0.07	14	0.01
Palo	Cochinilla harinosa	<i>Pinnococcus fuscus</i>	0.05 - 0.1	14	0.9
Wid					

P.C.: Partido da Carença

1 M.R.: limite máximo de resíduos

