

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para conservar bebidas y alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Hydroxymetil + Anilinoipirimidine**
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lívelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasládela a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 105

ITAGRO S.A.: +51 349-4805

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
- Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en silos destinados por las autoridades locales para tal fin.

Katrina®

700 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Fenhexamid : 500 g/kg
Cyprodinil : 200 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2075 - SENASA

ITAGRO

Título de Registro:
INDUSTRIA TECNOLÓGICA
AGRICOLA DEL PERU S.A.
Av. Javier Prado Este No. 6210
Int. 201 (Edificio Park Office La Molina)
La Molina, Lima - Perú.
Tel +51 349-0805 / www.itagro.com.pe

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Luyuan Road, Jiangning District,
Nanjing, China.

Contenido Neto: **1 kg**

N° de Lote:
F de Form:
F de Vinc:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KATRINA® 700 WG es un fungicida que combina la acción de dos ingredientes activos: Fenhexamid, inhibe el tubo germinativo impidiendo la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio ocasionando la muerte del patógeno, y Cyprodinil interfiere con el ciclo biológico durante la penetración y crecimiento del micelio en la superficie foliar y al interior. KATRINA® 700 WG se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de uso. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o rociador, tecnoras, patiboleros, etc.) que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/200L (días)	P.C. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
ARÁNDANO	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200 14 (a) 15 (b) 3
PALTO	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200 71 (a) 0.01 (b) 0.02

P.C.: Periodo de Curación

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
(a) Fenhexamid (b) Cyprodinil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia de la enfermedad y las condiciones climáticas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de KATRINA® 700 WG. Se recomienda una aplicación máxima de 2.0 kg /ha por campaña y una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso de requerir ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

KATRINA® 700 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas o sustancias alcalinas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.