Lovera®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Lambda-cyhalothrin.....105 g/L
Thiamethoxan.....141 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nº 1294 - SENASA

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A
Calle Loreto 304
Urb. Santa Patricia, II Etapa
La Molina, Lima - Perú
Teléfono 348-1018/349-9609

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu 214217. China
Tel.(86 - 510) 8785 1001

Contenido Neto : 20 L
Lote Nº :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, no beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Químico: Piretroide + Neonicotinoide
- En caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica.
- En caso de inhalación, mover a la persona al aire fresco.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. No inducir al vómito.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- No se ha determinado antídoto especifico.
- Nota al medico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 328 7700; ESSALUD: 411 8000 opción 4
  CISPROQUIM: 0800 50847; Infosalud: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECOTOXIC SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores de áreas cercanas días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No apuntar una boquilla de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En aplicación debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
LOVERA es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, bloqueando el paso de los iones de sodio en las membranas de las células nerviosas provocando parálisis o la muerte del insecto.

Preparación de la mezcla:
Mezclar la dosis recomendada de **LOVERA** en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda 1 aplicación por campaña cuando se observe los primeros daños de la plaga en el cultivo. No aplicar en época de floración por ser peligroso para las abejas.

PERIODO DE REINGRESO:
No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:
Puede ser mezclado con la mayoria de insecticidas y fungicidas comunmente utilizados, sin embargo se recomienda hacer una premezcla previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario.

FITOTOXICIDAD:
LOVERA no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	ml/200 L	ml/ha		
Arroz	"Mosca minadora"	*Hydrellia wirthi*	150	150	21	*0.6/**0.2
Cebolla	"Trips"	*Thrips tabaci*	150	300	14	*0.01/**0.2
Espárrago	"Caracha o Mosquilla de los brotes"	*Prodiplosis longifila*	150-200	300-400	7	*0.05/**0.02
Maíz	"Gusano Cogollero"	*Spodoptera frugiperda*	100-150	200-300	21	*0.05/**0.05
Palto	"Araña marrón"	*Oligonychus punicae*	-	200-300	7	*0.4/**0.02
Pimiento	"Mosca blanca"	*Bemisia tabaci*	150-200	300-400	30	*0.7/**0.1
	"Caracha" Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	200-250	400-500		

P.C.: Periodo de Carencia.
L.M.R: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)
*Thiamethoxam **Lambda-cyhalothrin