

# AVIATE 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

## COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin .....	50 g/kg
Mancozeb .....	700 g/kg
Aditivos .....	c.s.p. 1 kg

**Registro Nacional PQUA N° 2066 SENASA**

**Titular del Registro: UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.**

Calle Los Tulipanes N° 147, Of. 304, Surco, Lima 33 - Perú. Telf.: +511 7194085

CONTENIDO NETO:

**5 Kg**

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:  **UPL**

**UPL LIMITED.** Uniphos House, Madhu Park, 11th Road  
Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052, INDIA  
Tel. 91-22-2646 8000. Fax. 91-22-2604 1010.  
[www.uplonline.com](http://www.uplonline.com)

Importado y Distribuido por:

 **Farmex**

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (511) 630-6400 Fax: (511) 630-6410  
[www.farmex.com.pe](http://www.farmex.com.pe)

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Strobilurin + Dithiocarbamate.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 0800-13040**

**CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0800-10828**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- **Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empezando por la parte abierta, destruya el envase y déjelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.**

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**AVIATE 75 WG** es un fungicida con propiedades protectantes y sistémicas; controla hongos de la clase Ascomycetos (Mildeos polvosos), Basidiomicetos (royas y tizonos), Oomicetos (tizón tardío, Mildeos vellosos) y Deuteromicetos (manchas foliares).

**AVIATE 75 WG**, se prepara realizando una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/Ha	kg/200L		
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> L)	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	1.2 - 1.9	-	26	5.0 * 0.06 **
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0 - 2.5	-	7	7.0 * 0.2 **
Vid ( <i>Vitis vinifera</i> )	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	2.5 - 3.0	-	28	2.0 * 1.5 **
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Mancha negra del maíz	<i>Phyllachora maydis</i>	0.4-0.90	0.4-0.60	7	0.02 * 0.05 **

\* Azoxystrobin \*\* Mancozeb

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda aplicar **AVIATE 75 WG** en etapa de desarrollo vegetativo de los cultivos, cuando se observe los primeros síntomas y signos de la enfermedad. Aplicar máximo hasta dos aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año, y una frecuencia entre aplicaciones de 15 días. Aplique mediante aspersión foliar.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación. En caso de ingresar antes de las 24 horas se debe usar ropa de protección.

**COMPATIBILIDAD:**

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

**FITOTOXICIDAD:**

**AVIATE 75 WG** no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta. Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

“El titular de Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

