OTRAS INSTRUCCIONES

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para lavar los envases vacíos: lave tres veces los envases y agregue la solución al tanque de aplicación.

Para inutilizar y destruir los envases: los envases de plaguicidas deben ser perforados o triturados y luego enterrados en lugares destinados para ello.

En caso de derrames: se puede absorber el producto con aserrín o arena para luego recogerlo.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS L / ha	PC (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	Mosca minadora Polilla	*Liriomyza huidobrensis* *Tuta absoluta*	0.4 - 0.5 0.4 - 0.5	12 12	1.5 1.5
ALGODÓN	Gusano rosado Amelgado Gusano mayor de la hoja Perforador de bellotas	*Pectinophora gossypiella* *Cydalima perspectalis* *Alabama argillacea* *Heliothis virescens*	0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.2 - 0.3 0.3 - 0.4	12 12 12 12	2.0 2.0 2.0 2.0
TOMATE	Mosca minadora Polilla Gusano ejército	*Liriomyza huidobrensis* *Tuta absoluta* *Spodoptera eridania*	0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.3 - 0.4	12 12 12	0.5 0.5 0.5
CEBOLLA	Trips	*Thrips tabaci*	0.3 - 0.4	15	0.5
ALFALFA	Caballada	*Anticarsia gemmatalis*	0.3 - 0.4	12	0.5
SORGO	Mosquito del ovario del sorgo	*Contarinia sorghicola*	0.3 - 0.4	12	1.0
SOYA	Barrenador de brotes y vainas Caballada	*Epinotia aporema* *Anticarsia gemmatalis*	0.3 - 0.4 0.3 - 0.4	12 12	1.0 1.0
MANZANO	Polilla de la manzana	*Cydia pomonella*	0.3 - 0.4	15	0.5
PÁPRIKA	Mosca Minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.4 - 0.5	NA	0.1
ALCACHOFA	Mosca Minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.4 - 0.5	NA	2.0
HOLANTAO	Mosca Minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.4 - 0.5	NA	NA
PALTO	Trips	*Thrips tabaci*	1.0 - 1.5	NA	0.05
ESPÁRRAGO	Gusano del follaje Trips	*Copitarsia cornuta* *Thrips tabaci*	0.5 - 0.6 0.3 - 0.4	15 15	0.1 0.5
AJOS	Trips	*Thrips tabaci*	0.3 - 0.4	15	0.5

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia NA: No aplica

Época de aplicación: GALGOTRIN debe ser aplicado cuando se observen los primeros daños en el cultivo.

Frecuencia de aplicación: Puede repetirse la aplicación cada 7-14 días dependiendo de la infestación de la plaga. Realizar 2 aplicaciones por campaña.

Modo de acción: GALGOTRIN, es un insecticida con acción de contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, usado para el control de insectos plagas de los cultivos agrícolas.

Mecanismo de acción: Actúa principalmente sobre el ganglio basal del sistema nerviosos central, causando acciones nerviosas repetitivas a través de una prolongación de la permeabilidad del sodio durante la fase de recuperación de la acción potencial de las neuronas.

Compatibilidad: GALGOTRIN es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

Efectos sobre otros cultivos: No se ha observado ningún efecto negativo sobre otro cultivos donde se haya aplicado el producto.

Variedades susceptibles: Hasta el momento no se han reportado variedades susceptibles en nuestro país.

Número máximo de aplicaciones sucesivas por campaña: Se recomienda un máximo de dos aplicaciones sucesivas por campaña.

Método de aplicación: GALGOTRIN debe aplicarse en aspersiones foliares tratando de realizar una buena cobertura, mojando bien el follaje.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual, a motor y con bomba o pistola de alta presión.

Tamaño de gota: Usar boquilla de gota fina Tee Jet 8004.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta después de 24 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas".

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

GALGOTRIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Grupo Químico: PIRETROIDE

Concentrado Emulsionable - EC

Reg. PQUA Nº 2071-SENASA

COMPOSICIÓN:

Cypermethrin.....250g/L
Aditivos c.s.p.....1L

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1*RS*, 3*RS*; 1*RS*, 3*SR*) - 3 - (2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl=cyclopropanecarboxylate

FORMULA ESTRUCTURAL:



FORMULA EMPÍRICA Y PESO MOLECULAR:

$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$ 416.3

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DUWEST DROKASA PERÚ

INFLAMABLE

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : Líquido
- Color : Amarillo ámbar
- Olor : Característico
- Densidad : 0.96 g/l a 20°C
- Presión de Vapor : 2.3×10^{-7} mPa

Aditivos de Importancia Toxicológica: Ninguno.

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Capacidad	Material
1 Litro 500 ml 250 ml	Frasco plástico de polietileno de Tereftalato (PET) o polietileno de alta densidad (PEAD).

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A. Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9.
Magdalena del Mar Telf.: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADOR POR:
M/s HEMANI INDUSTRIES LTD.
C-701, 702, 703, 7th Floor, Neelkanth Business Park, Ramdev Mandir Road, Vidyaviahar (West), Mumbai 400086, India. +91-22-6140 7600 / +91-22-6140 7602

ENVASADO POR:
DROKASA PERÚ S.A. Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub Lote, Parcela 64, Lt B. Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.

COD: 1302808-V1

"Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños"

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casa de habitación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:

Realizar la mezcla: guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco. Manténgalo alejado del fuego directo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Síntomas específicos de intoxicación: Síntomas digestivos como dolor epigástrico, nauseas y vómitos; puede también tener ataques convulsivos o edema pulmonar.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido: Provocar el vómito con agua salada y tibia (aproximadamente 1 cucharada sopera por cada vaso de agua tibia).

Instrucciones si el producto ha sido inhalado: Mover al paciente al aire libre. Si el paciente no respira otorgarle respiración boca a boca. En caso extremo proporcione oxígeno.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: Lave la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.

TRATAMIENTO MEDICO

Tratamientos sintomático y de recuperación. Si se requiere realice un lavado gástrico.

En caso de Emergencias llamar a:

- **CETOX Línea gratuita de Emergencia Telf.: 0800-71911**
- **SAMU Telf.: 106**
- **DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 01 501 1000**

• NOTA AL MÉDICO: Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

INSTRUCCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

-Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
-No aplicar en época de floración y en presencia de polinizadores.
-Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes.
Evitar la deriva por el viento.
-Peligroso para organismo acuáticos.
No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los desechos ó envases vacíos.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA