

CALITOX[®]

50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Iprodione 500 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2006-SENASA



Titular de Registro:

INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C.

Calle Jorge Vanderghen N°315 Miraflores.

Lima, Perú.

Teléfono: (01) 422-5900

Fabricado y Formulado por:

YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS

Wanshi Town, Yixing City, Jiangsu Province

China

Importado y Distribuido por:

PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.

Av. Nicolas Arriola 2374 - San Luis

Lima - Perú

Telf.: (01) 547-0638

Contenido Neto : 0.5 Kg

Lote N°

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

® Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

MARCA CALITOX
PANTONE REFLEX BLUE C PANTONE 179

BANDA TOXICOLÓGICA
PANTONE 293 C

Logo de INAP
PANTONE 129 C PANTONE 7480 C PANTONE 7479 C

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Dicarboximidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, inducir al vómito (si es que la persona estuviese consciente).
- No dar de beber nada a una persona que se encuentre inconsciente.

En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)

ESSALUD Telf.: 0801-10200 (opción 4)

Nota al médico: Tratamiento sintomático

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del envase inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales.

- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CALITOX es un fungicida de contacto de acción preventiva y curativa. Para su aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CALITOX puede aplicarse durante la etapa de floración o cuajado del fruto. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

CALITOX es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

CALITOX no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	g/200L		
Páprika	Moho gris	Botrytis cinerea	0.75	300 - 400	7	5
Vid	Moho gris	Botrytis cinerea	0.8	400	7	10
Fresa	Moho gris	Botrytis cinerea	1.5*	750	3	10
Alcachofa	Moho gris	Botrytis cinerea	0.4	-	14	0.02
Cebolla	Moho gris	Botrytis cinerea	1 - 1.5	-	14	0.2
Mandarina	Moho gris	Botrytis cinerea	-	200 - 300	115	1

LMR: Límite máximo de residuos, partes por millón

PC: Período de carencia

*Gasto de agua: 420L/ha

