

CALITOX[®]

50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Iprodione 500 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2006-SENASA



Titular de Registro:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15
La Molina. Lima 12- Perú
Tel: (01)348 -1018.

Fabricado y Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por:

PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.

Av. Nicolas Arriola 2374 - San Luis
Lima - Perú
Telf.: (01) 547-0638

Contenido Neto : 25 Kg

Lote N°
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:
® Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

MARCA CALITOX 50 PM
PANTONE REFLEX BLUE C PANTONE 179

LOGO POINT ANDINA S.A.
PANTONE 356 C

BANDA TOXICOLÓGICA
PANTONE 293 C

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Dicarboximidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, inducir al vómito (si es que la persona estuviese consciente).
- No dar de beber nada a una persona que se encuentre inconsciente.

En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)

ESSALUD Telf.: 411-8000 (opción 4)

Nota al médico: Tratamiento sintomático

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CALITOX es un fungicida de contacto de acción preventiva y curativa. Para su aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CALITOX puede aplicarse durante la etapa de floración o cuajado del fruto. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

CALITOX es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

CALITOX no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

Cultivo	ENFERMEDADES		DOSIS		PC días	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	g/200L		
Páprika	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.75	300 - 400	7	5
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8	400	7	10
Fresa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5*	750	3	10
Alcachofa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	-	14	0.02
Cebolla	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1 - 1.5	-	14	0.2
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	200 - 300	115	1

LRM: Limite máximo de residuos en partes por millón

PC: Periodo de carencia

Gasto de agua: * 420L/ha

