

# CALITOX<sup>®</sup>

## 50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

### COMPOSICIÓN:

Iprodione ..... 500 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2006-SENASA



### Titular de Registro:

INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C.

Calle Jorge Vanderghen N°315 Miraflores.

Lima, Perú.

Teléfono: (01) 422-5900

### Fabricado y Formulado por:

YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS

Wanshi Town, Yixing City, Jiangsu Province

China

### Importado y Distribuido por:

PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.

Av. Nicolas Arriola 2374 - San Luis

Lima - Perú

Telf.: (01) 547-0638

Contenido Neto : 25 Kg

Lote N°

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

® Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

MARCA CALITOX  
PANTONE REFLEX BLUE C PANTONE 179

BANDA TOXICOLÓGICA  
PANTONE 293 C

Logo de INAP  
PANTONE 129 C PANTONE 7480 C PANTONE 7479 C

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Dicarboximidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, inducir al vómito (si es que la persona estuviese consciente).
- No dar de beber nada a una persona que se encuentre inconsciente.

### En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)

ESSALUD Telf.: 0801-10200 (opción 4)

Nota al médico: Tratamiento sintomático

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del envase inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales.

- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CALITOX es un fungicida de contacto de acción preventiva y curativa. Para su aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CALITOX puede aplicarse durante la etapa de floración o cuajado del fruto. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y por año.

### PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD:

CALITOX es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

### FITOTOXICIDAD:

CALITOX no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo   | ENFERMEDADES |                   | DOSIS   |           | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|--------------|-------------------|---------|-----------|--------------|--------------|
|           | Nombre común | Nombre científico | Kg/Ha   | g/200L    |              |              |
| Páprika   | Moho gris    | Botrytis cinerea  | 0.75    | 300 - 400 | 7            | 5            |
| Vid       | Moho gris    | Botrytis cinerea  | 0.8     | 400       | 7            | 10           |
| Fresa     | Moho gris    | Botrytis cinerea  | 1.5*    | 750       | 3            | 10           |
| Alcachofa | Moho gris    | Botrytis cinerea  | 0.4     | -         | 14           | 0.02         |
| Cebolla   | Moho gris    | Botrytis cinerea  | 1 - 1.5 | -         | 14           | 0.2          |
| Mandarina | Moho gris    | Botrytis cinerea  | -       | 200 - 300 | 115          | 1            |

LMR: Límite máximo de residuos, partes por millón

PC: Período de carencia

\*Gasto de agua: 420L/ha

