



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.

ENVIADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Av. Marcos Farfán 3459 - Independencia
Tel.: 521-3600 Fax: 386-6221
Room 2301, Hainua Plaza, No. 658 North Jiangsu
Road, Hangzhou, P.R. China.

FABRICADO Y FORMULADO POR:
NINGBO YHWEI CHEMICALS CO., LTD.

Teléfono: 501-1000
Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9
Magdalena del Mar Lima - Perú.

Capacidad	Materia
100 ml 250 ml 500 ml 1 litro 4 litros 20 litros	Frascos, bidones de polietileno de alta densidad.

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

- Estado físico : Líquido
- Color : Bronceado suave
- Olor : Aromático

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

REMEZÓN®


FUNGICIDA AGRÍCOLA
IMIDAZOL Y ACETAMIDA
SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Reg. PQUA N° 2060 - SENASA

NOMBRE COMÚN (ISO):
Cyazofamid.....80 g/L
Cymoxanil.....160 g/L

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
4-chloro-2-cyano-N,N-dimethyl-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide
2-Ciano-N-[(etilamino)carbonil]-2-(metoximino) acetamida

FÓRMULA ESTRUCTURAL



FÓRMULA EMPÍRICA: C₁₃H₁₃ClN₄O₂S (Cyazofamid)
C₇H₁₀N₄O₃ (Cymoxanil)

PESO MOLECULAR: 324.78

198.18

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones:
Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o
respirador.

Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta
de protección.

Características de los equipos de aplicación y ropa

- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos o bebidas para consumo.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar comida y bñese con abundante agua y jabón.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa primaras 24 horas.
- Utilice ropa protectora durante el manpuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las tapado y etiquetado.
- Conserve el producto en envases originales, bien de mezcla aplicación.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla aplicación, no ingerir.
- Este producto es de destino, no ingerir.
- seco y ventilado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El contacto prolongado o repetido puede causar

APLICACION
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS”

observado efectos negativos sobre otros cultivos
donde se haya aplicado el producto.

Método de aplicación: REMEZÓN se puede
aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre
como bomba de mochila manual.

Equipo de aplicación y calibración: Puede
aplicarse con bomba de mochila manual.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas
tratadas hasta 24 horas después de aplicado el
producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO
AGRÓNOMO”

Responsabilidad Civil: “El titular del registro
garantiza que las características físicas y químicas
del producto contenido en este envase
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que
es eficaz para los fines aquí recomendados, si se
usa y maneja de acuerdo a las instrucciones
dadas”.

Instrucciones si el producto ha sido inhalado: En caso
de inhalación, alejar al paciente del área contaminada y
colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en
posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio

persiste consulte con el médico.

limpia durante 15 minutos y si el contacto fuese con la
piel, lavarse con abundante agua y jabón, si la irritación

de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua
de contacto con el producto cae en ojos o piel: En caso

de respiración se mantengan limpios sin ninguna
persona está inconsciente, asegúrese que los canales
nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Si la

de intoxicación consiga ayuda médica. No dar de beber
Instrucciones si el producto ha sido ingerido: En caso

mediante la inhalación del aerosol.

La sustancia puede ser absorbida dentro del cuerpo
Sintomas específicos de intoxicación:

En caso de intoxicación llame al médico y
muestre la etiqueta y esta Hoja Informativa.

No almacene en casa de habitación.

Almacene el producto en sus envases originales,
sellados y conservelos en un lugar fresco y seco.

instrucciones de almacenamiento

En caso de derrames: se puede absorber con
aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo
en el sitio destinado por las autoridades locales
para este fin.

Frecuencia y época de aplicación:
Se recomienda realizar como máximo una
aplicación por campaña considerando 2 campañas
por año para el cultivo de papa.

Mecanismo de acción: REMEZÓN es un
fungicida compuesto por una mezcla de fungicidas
sistémicos que inhiben el crecimiento normal del
hongo. Cyazofamid inhibe el Complejo III en la
mitocondria de los oomycetos; Cymoxanil inhibe
la síntesis de ADN.

Modo de acción: REMEZÓN, es un fungicida de
contacto, sistémico y translaminar de acción
protectante y curativa.

Compatibilidad: REMEZÓN es compatible con la
mayoría de productos fitosanitarios de uso común,
excepto con los de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando
se sigan las instrucciones de uso especificadas en
la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación
en los cultivos recomendados.

Efectos sobre otros cultivos: No se han

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y
ENVASES VACÍOS
Para lavar los equipos de aplicación: lavar
tres veces el equipo de aplicación con agua
limpia, eliminar el agua de enjuague en una
zona sin riesgo de contaminación.

Para inutilizar y destruir los envases:
Después de usar el contenido, enjuague 3
veces el envase y vierta la solución en la mezcla
de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o
perforándolo y deposítelo en el lugar destinado
por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple
lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al
centro de acopio autorizado



INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	mL cil.		
PAPA	Rancha	Phytophthora infestans	0.75 -	375 - 500	14	0.01* 0.05**
VID	Mildió	Plasmopara viticola	1.00	200	28	2.00* 0.30**

PC: Período de carencia
(*) Cyazofamid
(**) Cymoxanil

LMR: Límite máximo de residuos



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO