

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Este producto es dañino, no ingerir.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en envases originales, bien tapado y etiquetado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas para consumo
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Imidazol (Cyazofamid) + Acetamida (Cymoxanil)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, ayudando que los párpados estén levantados
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado y brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de Emergencias llamar a: **CICOTOX Telf.: 0800-13040; ESSALUD Telf.: 0801-10200**
- **NOTAALMÉDICO:** Dar tratamiento sintomático, no tiene antídoto específico.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- PELIGROSO para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos del producto.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar el producto directamente al suelo ni en zonas con napa freática superficial o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva

COD. 782804



# REMEZÓN®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN**

- Cyazofamid..... 80 g/L
- Cymoxanil..... 160 g/L
- Aditivos.....c.s.p. 1 Litro

**Reg. PQUA Nº 2060 - SENASA**

TITULAR DE REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**  
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar.  
Lima - Perú. Telf.: 501-1000



FORMULADO POR:  
NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD  
Room 2301, Haihua Plaza, No. 658 North  
Jianguo Road, Hangzhou, P.R. China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**

**CONTENIDO NETO: 1 Litro**

Número de Lote  
Fecha de Formulación  
Fecha de Vencimiento

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**REMEZÓN**, es un fungicida con acción de contacto, traslaminar y sistémico usado para el control de enfermedades fungosas. **REMEZÓN** es un fungicida compuesto por una mezcla de 2 fungicidas sistémicos que inhiben el crecimiento normal del hongo.

Para la preparación de **REMEZÓN**, haga una premezcla en poca agua, agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite de nuevo constantemente y proceda a aplicar

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**USOS Y DOSIS**

CULTIVOS	E N F E R M E D A D E S		D O S I S		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/ 200 L		
PAPA	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.75 - 1	375-500	14	0.01* 0.05**
VID	Mildiú	<i>Plasmopara viticola</i>	1.00	200	28	2.00* 0.30**

PC: Período de carencia

(\*) Cyazofamid

(\*\*) Cymoxanil

LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda realizar como máximo una aplicación por campaña considerando 2 campañas por año para el cultivo de papa.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Cuando se aplica a campo abierto, se debe esperar un mínimo de 24 horas para el ingreso de personas.

**COMPATIBILIDAD: REMEZÓN**, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

**FITOTOXICIDAD: REMEZÓN**, no es fitotóxico si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

