

# PREVENGO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRANULOS DISPERSABLES (WG)**

**COMPOSICIÓN:**

Cyprodinil .....	375 g/Kg
Fludioxonil .....	250 g/Kg
Aditivos .....	c.s.p. 1 Kg

**Reg. PQUA N° 2072 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.**



**FORMULADO POR:**

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED.**  
Room 1510, N°500 Xinjiang Road,  
Shanghai CHINA

**Importador y Distribuidor:**  
**CAPEAGRO S.A.C.**  
Av. Benavides 2150, Ofic. 803  
Miraflores - Lima  
[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

Contenido Neto: **0.5 Kg**  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
  - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
  - Causa irritación moderada a los ojos.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
  - Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
  - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Anilino pirimidina (Cyprodinil) + Fenilpirroles (Fludioxonil).
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - **ANTIDOTO:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)  
 CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**.INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **PREVENGO** es un fungicida que tiene como ingrediente activo al Cyprodinil, fungicida sistémico de amplio espectro que actúa en el ciclo de vida del hongo durante la penetración y crecimiento del micelio dentro de la planta así como en la superficie de la hoja; y al Fludioxonil, fungicida de contacto con largo efecto residual que inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento de los tubos germinales y micelio en la superficie de los tejidos afectados.

- **Modo de Preparación:** Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **PREVENGO** máximo 2 aplicaciones por campaña y 1 campaña/ año en el cultivo de vid, en presencia de la enfermedad luego de haber efectuado una evaluación del campo o cuando las condiciones ambientales sean favorables para la aparición de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** El producto es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente usados.

**FITOTOXICIDAD:** En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectado respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no se debe esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (kg/ha)	PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico			
Vid	“Podredumbre gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	21	3.0 (a) 2.0 (b)
Cebolla	“Podredumbre gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	11	0.3 (a) 0.5 (b)

\*P.C.: Periodo de carencia (días)    \*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos    (a) Cyprodinil    (b) Fludioxonil

