

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# PREVENGO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**COMPOSICIÓN:**

Cyprodinil ..... 375 g/Kg  
Fludioxonil ..... 250 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

**Reg. PQUA N° 2072 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**  
**CAPEAGRO S.A.C.**



**FORMULADO POR:**  
**AGROMOL BIOTECH CO.,LTD**  
East side, middle section of Binhe Road, Shanxian  
County Chemical Industry Park, Xieji Town,  
Shanxian County, Heze City, Shandong Province,  
China

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**  
**CAPEAGRO S.A.C.**

Av. Benavides 2150. Ofic. 803 Miraflores - Lima  
[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:  
**0.5 kg**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

# LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice aplicación siguiendo la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

### - GRUPO QUÍMICO: ANILINOPIRIMIDINA (CYPRODINIL) + FENILPIRROLES (FLUDIOXONIL).

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

Llamar a ESSALUD: 411 8000 anexo 4. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

## CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya el envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **PREVENGO** es un fungicida que tiene como ingrediente activo al Cyprodinil, fungicida sistémico de amplio espectro que actúa en el ciclo de vida del hongo durante la penetración y crecimiento del micelio dentro de la planta así como en la superficie de la hoja; y al Fludioxonil, fungicida de contacto con largo efecto residual que inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento de los tubos germinales y micelio en la superficie de los tejidos afectados.

- **Modo de Preparación:** Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

## FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **PREVENGO** máximo 2 aplicaciones por campaña y 1 campaña/año en el cultivo de vid, en presencia de la enfermedad luego de haber efectuado una evaluación del campo o cuando las condiciones ambientales sean favorables para la aparición de la enfermedad.

## PERIODO DE REINGRESO:

Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

## COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente usados.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos..

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO  | ENFERMEDAD         |                                     | DOSIS<br>(kg/ha) | PC*<br>(días) | LMR**<br>(ppm)     |
|----------|--------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
|          | N. común           | N. Científico                       |                  |               |                    |
| Arándano | “Podredumbre gris” | <i>Botrytis cinerea</i>             | 0.8 - 0.9        | 2             | 3.0 (a)<br>5.0 (b) |
| Vid      | “Podredumbre gris” | <i>Botrytis cinerea</i>             | 1.0              | 21            | 3.0 (a)<br>2.0 (b) |
| Páprika  | “Podredumbre gris” | <i>Botrytis cinerea</i>             | 1.0              | 7             | 1.5 (a)<br>1 (b)   |
| Cebolla  | “Podredumbre gris” | <i>Botrytis cinerea</i>             | 0.8 - 1          | 11            | 0.3 (a)<br>0.5 (b) |
| Palto    | “Cladosporium”     | <i>Cladosporium cladosporioides</i> | 0.8              | 3             | 1.0 (a)<br>1.5 (b) |

\*P.C.: Periodo de carencia (días) \*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos (a) Cyprodinil (b) Fludioxonil

