

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SPINOUT® 50% WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables en agua - WG

Composición

Trifloxystrobin 500 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: ESTROBILURINAS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos aproximadamente.

En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.

Antídoto: No existe antídoto específico.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 / **ESSALUD:** 4237600

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de los envases, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPINOUT 50% WG es un fungicida perteneciente a una nueva generación del grupo de las estrobilurinas. Destaca por ser un fungicida preventivo con efecto mesostémico: es decir presenta una gran afinidad con la superficie vegetal y es absorbido por las capas cerosas de las hojas. Inhibe la respiración celular de los hongos.

Indicaciones de uso:

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/ha	P.C. (Días)	LMR (mg/Kg)
	Nombre común	Nombre científico			
ESPÁRRAGO	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.2	N.D.	0.05

P.C.: Período de carencia / N.D.: No determinado / L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **SPINOUT 50% WG** (i.a. Trifloxystrobin) recomendado a 01 aplicación por campaña, considerando 02 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Instituto Peruano del Espárrago
y Hortalizas

Registro PQUA N° 0000 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: IPEH

FORMULADOR: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750

Jinan, Shandong, China

+86-531-88875230

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: IPEH

Calle 21 Nro 713 Of. 205, San Isidro PERÚ

Telefax: (511) 2255951- 2267332

www.ipeh.org.pe

® = Marca Registrada por IPEH

Fecha de Formulación:

N° Lote:

Contenido Neto: 25Kilos

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

