

Tamaño: 28.8 x 14.8
24.10.22

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de precaución. En su manejo se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para los plaguicidas:

- Leer detenidamente la etiqueta.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa
- No comer, fumar, ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto
- Terminada la aplicación lavarse y bañarse con abundante agua y jabón
- Manténgase el producto alejado del fuego
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicamentos de uso humano y animal
- Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Guardar en un lugar fresco y seco con bastante ventilación
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques, drenajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión haga lavado estomacal y siga con tratamiento sintomático:

DL₅₀ Oral Aguda (ratones) : > 5,000 mg/Kg
DL₅₀ Dermal Aguda (ratones) : 1,000 mg/Kg

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

☎ SAMU: 106
☎ SERFI: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Para envases rígidos:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MAXI-GROW[®] EXCEL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

SOLUCIÓN ACUOSA

Composición:

Combinación de extractos vegetales	114.20 g/L	Magnesio (Mg)	3.96 g/L
Auxinas	0.092 g/L	Fierro (Fe)	17.42 g/L
Giberelinas	0.106 g/L	Zinc (Zn)	26.92 g/L
Citoquininas	1.52 g/L	Manganeso (Mn)	13.46 g/L
Nitrógeno (N)	6.60 g/L	Cobre (Cu)	13.46 g/L
Fósforo (P ₂ O ₅)	13.46 g/L	Aditivos	csp 1 L
Potasio (K ₂ O)	13.46 g/L		
Calcio (Ca)	1.98 g/L		

PBUA N° 153 - SENASA

Titular del Registro Serfi SA



Formulado por:
COSMOCEL S.A.
Vía Matamoros No. 1901
MEXICO

Importado y Distribuido por:



Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

Contenido Neto: 1 Litro

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAXI-GROW EXCEL es un regulador de crecimiento complejo de origen orgánico que contiene auxinas, giberelinas y citoquininas; además de nutrientes en forma quelatada. Todos estos componentes interactúan sobre los procesos metabólicos de las plantas, incrementando el rendimiento y la calidad de las cosechas.

MAXI-GROW EXCEL se usa en pulverización sobre el follaje. Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase, agregar la cantidad de producto que se va a usar y agitar, después se agrega el total de agua que se va a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Dosis			PC (días)	LMR (ppm)
	L/cil 200L	L/ha	L/campaña		
Algodón	0,25	1,0	1,0	N.A.	N.A.
Arándano	0,2 – 0,3	0,4 – 0,6	0,4 – 0,6	N.A.	N.A.
Arroz	1,0	1,0	1,0	N.A.	N.A.
Brócoli	0,25	0,5	1,0	N.A.	N.A.
Mandarina	0,25	1,0	1,0	N.A.	N.A.
Palto	0,25 – 0,30	1,0 – 1,5	1,0 – 1,5	N.A.	N.A.
Piña	0,3 – 0,4	0,6 – 0,8	0,6 – 0,8	N.A.	N.A.
Vid	0,25	1,0	2,0	N.A.	N.A.

PC: Período de Carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm) N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- En algodón: se recomienda hacer 2 aplicaciones, la primera al inicio de la floración y la segunda: 2 – 3 semanas después.
- En arándano: se recomienda una aplicación por campaña. En floración o al inicio de la formación de frutos.
- En arroz: se recomienda hacer la aplicación 10 días antes del punto de algodón.
- En brócoli: se recomienda hacer 2 aplicaciones, la primera 30 días después del trasplante y la segunda: 15 días después.
- En mandarina y palto: se recomienda hacer 2 aplicaciones, la primera en el cuajado de frutos y la segunda en la fructificación.
- En piña: se recomienda hacer 2 aplicaciones, la primera: 1 a 2 semanas después de la inducción floral y, la segunda aplicación al inicio de la floración.
- En vid: se recomienda fraccionar la dosis en 3 aplicaciones, la primera: en pre – floración, la segunda: en cuajado y la tercera: en baya (10 – 12 mm).

PERIODO DE REINGRESO

No ingresa al área tratada antes de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL


El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



MV PRODUCCIONES GRAFICAS



■ C100 M0 Y0 K0 ■ C78 M2 Y98 K9
■ C0 M30 Y95 K0 ■ K100