**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es ligeramente peligroso. En su manejo se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para los plaguicidas:

- Leer detenidamente la etiqueta.
- Evitar contacto con la piel , los ojos y la ropa
- No comer, fumar, ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto
- Terminada la aplicación lavarse y bañarse con abundante agua y jabón
- Manténgase el producto alejado del fuego
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicamentos de uso humano y animal
- Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames .
- Guardar en un lugar fresco y seco con bastante ventilación
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques, drenajes.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de ingestión haga lavado estomacal y siga con tratamiento sintomático:

$DL_{50}$ Oral Aguda (ratones) : > 5,000 mg/Kg
$DL_{50}$ Dermal Aguda (ratones) : 1,000 mg/Kg

Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación :

**CETOX: Tel. 273-2318 ; 0800-7-1911**
**ESSALUD: 411-8000 (opción 433**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# MAXI-GROW® EXCEL

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

***SOLUCION ACUOSA***

**Composición:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Combinación de extractos vegetales | 114.20 g/L | Magnesio(Mg) | 3.96 g/L |
| Auxinas | 0.092 g/L | Fierro (Fe) | 17.42 g/L |
| Giberelinas | 0.106 g/L | Zinc (Zn) | 26.92 g/L |
| Citoquininas | 1.52 g/L | Manganeso (Mn) | 13.46 g/L |
| Nitrógeno (N) | 6.60 g/L | Cobre (Cu) | 13.46 g/L |
| Fósforo ($P_2O_5$) | 13.46 g/L | Aditivos | csp 1 L |
| Potasio ($K_2O$) | 13.46 g/L | | |
| Calcio (Ca) | 1.98 g/L | | |

**Reg. PBUA Nº 153 - SENASA**

Titular del Registro **Serfi SA**

Importado y Distribuido por:

Serfi SA®
Av. Oscar R. Benavides (ex-Diagonal)
380, Of. 701Miraflores Lima 18 Perú.
Teléfono: 446-2896

Fabricado por:
**COSMOCEL S.A.**
Vía Matamoros No. 1501
MEXICO

Lote No.:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

**Contenido Neto: 250 ml**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MAXI-GROW EXCEL** es un regulador de crecimiento complejo de origen orgánico que contiene auxinas, giberelinas y citoquininas; además de nutrientes en forma quelatada. Todos estos componentes interactúan sobre los procesos metabólicos de las plantas, incrementando el rendimiento y la calidad de las cosechas.

**MAXI-GROW EXCEL** se usa en pulverización sobre el follaje. Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase , agregar la cantidad de producto que se va a usar y agitar , después se agrega el total de agua que se va a aplicar.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

| Cultivo | Dosis | | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | L/cil 200 L | L/ha | L/campaña | | |
| Algodón | 0,25 | 1,0 | 1,0 | N.A | N.A. |
| Arroz | 1,0 | 1,0 | 1,0 | N.A. | N.A. |
| Brócoli | 0,25 | 0,5 | 1,0 | N.A. | N.A. |
| Vid | 0,25 | 2,0 | 2,0 | N.A. | N.A. |

**PC**: Período de Carencia (días) **LMR** : Límite Máximo de Residuos (ppm) **N.A**: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- En Algodón: se recomienda hacer 2 aplicaciones, la primera al inicio de la floración y la segunda: 2-3 semanas después.
- En Arroz: se recomienda hacer la aplicación 10 días antes del punto de algodón.
- En Brócoli: se recomienda hacer 2 aplicaciones, la primera 30 días después del transplante y la segunda: 15 días después.
- En Vid: se recomienda fraccionar la dosis en 3 aplicaciones, la primera: en pre-floración, la segunda: en cuajado y la tercera: en baya (10-12 mm).

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresa al área tratada antes de 12 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenidas en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS

**PRECAUCIÓN**

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO

Pega