



LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Evitar la ingestión del producto, inhalar sus vapores o aspirar la neblina de aspersión.
• Puede producir irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
• Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -5 °C o superiores a 35 °C.
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS
• Grupo Químico: Benzoylureas.
• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
• Teléfonos de emergencia: **CICOTOX: 080013040 ó CISPROMIM: 080050847 ó ESSALUD: 080110200.**
• Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
• En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado diluido en agua.
• No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
• No hay antídoto específico conocido!, aplicar terapia sintomática.
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.
• Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

• Devuelva el envase del triple lavado al centro de acopio autorizado.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• Tóxico para organismos acuáticos.
• No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
• En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.





PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
INSECTICIDA AGRICOLA
Concentrado Emulsionable - EC

Reg. N° 645-98-AG-SENASA
Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguin 335, Of. 808.
Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima, Perú
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:
FARMAGRO II
Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos - Lima
Tel: 614-1500 Fax : 614-1517; 614-1516
RUC: 20100180210

Formulado por:
Syngenta S.A.
Via a Mamonal, Km. 6
Cartagena, Colombia.



NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

20 Litros

syngenta®

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Para obtener un control óptimo y económico **SORBA® 50 EC** debe ser aplicado tan pronto como se observen los primeros estadios larvales de las plagas ya que es el momento en que estas son mas susceptibles. Repetir las aplicaciones a intervalos de 8 - 10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga.
• Se recomienda aplicar **SORBA® 50 EC** con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de la planta, sobre todo en las zonas donde se encuentran comiendo las larvas de las plagas a controlar. De acuerdo a la experiencia práctica se recomienda emplear entre 200 a 400 litros de caldo insecticida por hectárea con plantas chicas y 600 litros de caldo insecticida por hectárea como mínimo con plantas desarrolladas.
• **SORBA® 50 EC** puede ser aplicado con pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
• **SORBA® 50 EC** es fácil de preparar y puede hacerse directamente en el depósito del equipo a utilizar. Basta diluir la cantidad seleccionada del producto en volumen de agua a aplicar. Agítese bien antes de llenar el tanque del equipo a utilizar para obtener una buena y uniforme solución.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	mL/200 L		
Alcachofa	Gusano menor de la hojas	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	0.5 - 0.75	250 - 300	14	0.1
	Gusano mayor de la hoja	<i>Anomis texana</i>	0.3 - 0.5		28	0.02
	Gusano perforador de la bellota	<i>Alabama argillacea</i>	0.4 - 0.6	200 - 300		
Cítricos	Minador de brotes de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>		200 - 300	15	1
Col	Gusano o polilla de la col	<i>Plutella xylostella</i>	0.5	200		
Coliflor	Gusano medidor de la hoja	<i>Chrysodeixis includens</i>	0.4 - 0.5	150 - 160	14	0.1
	Barrenador de brotes	<i>Hellula undalis</i>	0.5	200		
Esparrago	Caballada	<i>Prodenia sp.</i>				
	Gusano de tierra	<i>Copitarsia turbata</i>		200	100	0.02
	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>				
Frijol	Barrenador de los brotes	<i>Crociosema aporema</i>	0.4 - 0.5	150 - 160		
Vainita	Gusano pegador de las hojas	<i>Omiodes indicata</i>	0.7 - 0.8	200 - 250	35	0.02
	Barrenador de brotes y vainas	<i>Laspeyresia leguminis</i>	0.4 - 0.5	150 - 160		
Garbanzo	Gusano silbador	<i>Heliothis virescens</i>		200 - 300		
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>		200	35	0.02
Papa	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta absoluta</i>	0.5 - 0.6	160 - 200		
Tomate	Gusano medidor de la hoja	<i>Chrysodeixis includens</i>	0.4 - 0.5	150 - 160	7	0.05
	Caballada	<i>Spodoptera spp.</i>				
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.6 - 0.7		7	1
	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>		100 - 200		

PC.: Periodo de Carenacia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm) ND: No Determinado
• **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Para obtener un control óptimo y económico **Sorba 50 EC** debe ser aplicado tan pronto como se observen los primeros estadios larvales de las plagas ya que es el momento en que estas son mas susceptibles. Repetir las aplicaciones a intervalos de 8-10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga.
• **PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.
• **COMPATIBILIDAD:** **SORBA® 50 EC** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas mas comunmente utilizados; en caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.
• **FITOTOXICIDAD:** **SORBA® 50 EC** a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos.
Responsabilidad Civil: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

UN 1993
LIQUIDO INFLAMABLE, N.O.S.,
(Contiene lufenuron)

