



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar la ingestión del producto, inhalar sus vapores o aspirar la neblina de aspersión.
- Puede producir irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -5 °C o superiores a 35 °C.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Benzoylureas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado diluido en agua.
- No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido!, aplicar terapia sintomática.
- Teléfonos de emergencia: SAMU: 106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú (01) 434-5600; CISPROQUIM: 080050847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase del triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vados.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



70 x 15 cms



SORBA® 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición
Lufenuron 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 litro

Reg. N° 645-98-AG-SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335, Of. 808.
Urb. Los Granados, Santiago de Surco. Lima, Perú
RUC: 20501511740

Importado y Distribuido por:
FARMAGRO II
Av. Principal 2, Mz C5 (Lote 38, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este
San Antonio – Huarochiri, Lima
Central: (01) 6141500

Formulado por:
Syngenta S.A.
Via a Mamonal, Km. 6
Cartagena, Colombia.



NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

20 Litros

Los residuos de plaguicidas que permanezcan en el envase deben ser destruidos y no reutilizados.

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Para obtener un control óptimo y económico SORBA® 50 EC debe ser aplicado tan pronto como se observen los primeros estadios larvales de las plagas ya que es el momento en que estas son mas susceptibles. Repetir las aplicaciones a intervalos de 8 - 10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga.

- Se recomienda aplicar SORBA® 50 EC con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de la planta, sobre todo en las zonas donde se encuentran comiendo las larvas de las plagas a controlar. De acuerdo a la experiencia práctica se recomienda emplear entre 200 a 400 litros de caldo insecticida por hectárea con plantas chicas y 600 litros de caldo insecticida por hectárea como mínimo con plantas desarrolladas.
- SORBA® 50 EC puede ser aplicado con pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
- SORBA® 50 EC es fácil de preparar y puede hacerse directamente en el depósito del equipo a utilizar. Basta diluir la cantidad seleccionada del producto en volumen de agua a aplicar. Agítese bien antes de llenar el tanque del equipo a utilizar para obtener una buena y uniforme solución.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"							
CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	mL/200 L			
Alcachofa	Caballada	<i>Spodoptera eridania</i>		250 - 300	14	0.1	
Algodón	Gusano perforador	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	0.5 - 0.75		28	0.02	
	Gusano menor de la hoja del algodónero	<i>Anomis texana</i>	0.3 - 0.5				
	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>					
	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.4 - 0.6	200 - 300			
Cítricos	Minador de brotes de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>		200 - 300	15	1	
Col Coliflor Col china	Gusano o polilla de la col	<i>Plutella xylostella</i>	0.5	200	14	0.1	
	Gusano medidor de la hoja	<i>Chrysodeixis includens</i>	0.4 - 0.5	150 - 160			
	Barrenador de brotes	<i>Hellula undalis</i>	0.5	200			
Esparrago	Caballada	<i>Prodenia sp.</i>			100	0.02	
	Gusano de tierra	<i>Copitarsia turbata</i>		200			
	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>					
Frijol	Barrenador de los brotes	<i>Crociosema aporema</i>	0.4 - 0.5	150 - 160	35	0.02	
Vainita	Gusano pegador de las hojas	<i>Omiodes indicata</i>	0.7 - 0.8	200 - 250			
	Barrenador de brotes y vainas	<i>Laspeyresia leguminis</i>	0.4 - 0.5	150 - 160			
Garbanzo	Gusano silbador	<i>Heliothis virescens</i>		200 - 300	35	0.02	
Maiz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>		200			
Papa	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta absoluta</i>	0.5 - 0.6	160 - 200	7	0.05	
Tomate	Gusano medidor de la hoja	<i>Chrysodeixis includens</i>	0.4 - 0.5	150 - 160			
	Caballada	<i>Spodoptera sp.</i>					
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.6 - 0.7		7	1	
	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>		100 - 200			

PC.: Período de Carenia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para obtener un control óptimo y económico SORBA® 50 EC debe ser aplicado tan pronto se observen los primeros estadios larvales de la plaga a controlar. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7 - 10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga. Para alcachofa, algodón, cítricos, frijol, vainita, garbanzo, papa, tomate y pimiento realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña, siendo 1 campaña/año. En el caso de col, coliflor y col china realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña, siendo 2 campañas/año y para espárrago y maíz realizar 2 aplicaciones/año siendo 1 1/2 campañas/ año (3 aplicaciones/año).

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada antes de las 48 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: SORBA® 50 EC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas mas comúnmente utilizados; en caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD: SORBA® 50 EC a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

UN 1993

**LIQUIDO INFLAMABLE, N.O.S.,
(Contiene lufenuron)**

