

19 cm

# VICTOZA®

EXTRACTO VEGETAL


**INSECTICIDA – ACARICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

COMPOSICIÓN

Matrine ..... 0.5 %  
Aditivos ..... 99.5 %

**Reg. N° 001-SENASA-PBA-EV**



**Titular de Registro, Importado y Distribuido por:**

**POINT ANDINA S.A**

Calle Loreto 304  
Urb. Sta Patricia, II Etapa  
La Molina, Lima - Perú  
Teléfono 348 7018 349-9609

**Formulado por:**

**POINT AGRO - CHINA LTD.**

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu 214217. China  
Tel. (86 - 510) 8785 1001

Contenido Neto : 20 L  
Lote N° :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**PRECAUCIÓN**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- No desatorar las boquillas de la pulverizadora con la boca.
- Después de la aplicación quitarse la ropa contaminada y lavar todas las zonas expuestas con agua y jabón.
- Realizar el triple lavado de los envases volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.
- Almacenar el producto en su envase original bien cerrado.
- Mantener fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas y animales.
- Almacenar en áreas bien ventiladas, frescas, secas y oscuras, alejado de temperaturas altas y sol fuerte.
- Almacenar separado de los alimentos.
- Transportar en su envase original cerrado y asegurar la carga de modo de evitar caídas y derrames.
- Transportar el producto en vehículos aptos para el movimiento de productos fitosanitarios, con la etiqueta del transporte correspondiente.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Inhalación: Sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado, mantenerlo abrigado y en reposo. Buscar de inmediato asistencia médica.
- Piel: Retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo afectadas.
- Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos.
- Sostener los párpados separados mientras se lavan, para asegurar que todo el ojo y el párpado se limpien bien. Acudir a un médico inmediatamente.
- Ingestión: Inducir al vomito, si la persona está consciente, lavar la boca con agua limpia y tomar varios vasos de agua para dispersar el producto ingerido.
- Transportar el afectado inmediatamente a un centro asistencial. Nunca suministre nada por la boca cuando esté inconsciente y mantenerlo acostado de lado.
- **Antídoto. Nota al médico. No tiene antídoto específico.**
- Teléfono de emergencia: **CICOTOX: 328 7700; ESSALUD: 411 8000 opción 4; CUPROQUIM: 0800 50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.

- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**VICTOZA**, es un insecticida – acaricida biológico de origen vegetal con acción principalmente de contacto y estomacal. Actúa sobre el sistema nervioso central del insecto causando parálisis, impidiendo el entrada de aire y finalmente muerte por asfixia, suprime además la ingestión de alimentos reduciendo la viabilidad larval e impidiendo el crecimiento del insecto.

**Forma de preparación y aplicación:**

Para la preparación de la mezcla es necesario llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto que se va a utilizar, agitar y mezclar homogéneamente, agregar el coadyuvante si es que se va a utilizar y verter en el tanque del equipo que se va a utilizar, completar con agua hasta llenar el tanque. En caso de utilizar máquinas de aplicación mantener los agitadores en funcionamiento. Se puede aplicar con equipos manuales y motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Los mejores resultados se obtienen pulverizando en la tarde, evitando las horas de mayor radiación solar y alta temperatura.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas con excepción de los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Arándano	“Mosca blanca”	<i>Aleurodicus juleikae</i>	0.35	-	NA	NA
Granada	“Pulgón”	<i>Aphis gossypii</i>	-	2.0	NA	NA
Mandarina	“Ácaro del tostado”	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	1.0	NA	NA
Palto	“Arañita marrón”	<i>Oligonychus punicae</i>	0.3	-	NA	NA
Vid	“Arañita roja”	<i>Tetranychus urticae</i>	0.2	-	NA	NA

**P.C:** Periodo de Carencia

**LMR:** Límite máximo de Residuos (partes por millón)

**NA:** No aplica



PANTONES



LOGO POINT

TRIANGULO TRIPLE LAVADO

BANDA TOXICOLÓGICA

LOGO VICTOZA

20 cm