

DOMARK[®] 100 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Tetraconazole 100 g/L

Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 2087 - SENASA

Titular de Registro:
FSR CONSULTORES E.I.R.L.

Formulador:
ISAGRO S.p.A.

Importador y distribuidor:
BAYER S.A.



Contenido Neto: 200 ml
N° de Lote
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Inflamable



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta y la hoja informativa.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / FSR CONSULTORES EIRL: 920534766

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L	%		
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.8	-	-	7	0.5
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	-	-	7	0.1
Manzana	Oidiosis	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.8	0.2	0.1	7	0.3
Palto	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.8	0.16	-	35	0.01
	Cladosporium	<i>Cladosporium herbarum</i>	0.9	0.18	-	35	0.01
Durazno	Oidiosis	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	0.6 - 0.8	0.15 - 0.20	-	14	0.03
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.15 - 0.25	-	7	0.2

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

