

# DOMARK<sup>®</sup> 100 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Tetraconazole ..... 100 g/L  
 Aditivos ..... csp 1L

Reg. PQUA N° 2087 - SENASA

Titular de Registro:  
 FSR CONSULTORES E.I.R.L.

Formulador:  
 ISAGRO S.p.A.

Importador y distribuidor:  
 BAYER S.A.



Contenido Neto: 500 ml  
 N° de Lote  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

Inflamable

Nocivo en caso de ingestión  
 Nocivo en contacto con la piel  
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta y la hoja informativa.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106  
 FSR CONSULTORES EIRL: 920534766

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Ha	L/200L	%		
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.8	-	-	7	0.5
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	-	-	7	0.1
Manzana	Oidiois	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.8	0.2	0.1	7	0.3
Palto	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.8	0.16	-	35	0.01
Durazno	Oidiois	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	0.6 - 0.8	0.15 - 0.20	-	14	0.03

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

