27 cm

15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Este producto es de cuidado. No Ingerir.
Causa irritación moderada a los ojos.
Causa irritación a la piel.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo químico: Triazoles
En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavarlos con abundante agua por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación: mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si fuera necesario.
Nota al médico: no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Linea gratuita) INTEROC S.A.: (511) 614-5100
ESSALUD: 0800-10-828

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido del envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

DOMARK® 100 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
Tetraconazole ..... 100 g/L
Aditivos ..... csp 1L

PQUA Nº - SENASA

INTEROC

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

ISAGRO

Formulado por:
ISAGRO S.p.A.
Centro Uffici San Iro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Italia

Contenido Neto: 1L
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
DOMARK® 100 EC es un fungicida sistémico, con propiedades protectantes, curativas y erradicantes. El ingrediente activo Tetraconazole actúa sobre la forma vegetativa del hongo, bloqueando el desarrollo del micelio del patógeno, tanto dentro como fuera de la planta.
La aplicación de **DOMARK® 100 EC** se debe realizar en forma dirigida a la parte aérea (hojas) con equipo de pulverizador de mochila manual, con gota fina como un rocío o lluvia, evitando chorreo.
Para la aplicación calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretenda asperjar. Se coloca en el tanque de mezcla la mitad de agua que se va a emplear, y se adiciona la cantidad de **DOMARK® 100 EC** de acuerdo a la dosis recomendada, luego agitar la mezcla. Finalmente adicionar el resto de agua y aplicar al producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO			
Vid (*Vitis vinífera*)	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.8	7	0.5
Pimiento (*Capsicum annuum*)	Oidiosis	*Liveillula taurica*	0.2	7	0.1

PC = Periodo de Carencia LMR = Límite Máximo de Residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda aplicar **DOMARK® 100 EC** (i.a Tetraconazole) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año para ambos cultivos.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
No se ha reportado incompatibilidades de este producto con otros productos fitosanitarios.

FITOTOXICIDAD:
No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

2.25 cm