

Formulado por:
SERFI S.A.
 Av. Oscar R. Benavides (ex-Diagonal)
 N° 380 Of. 701, Miraflores Lima - Perú
 Teléfono: 51(1) 446-2896
 Distribuido por:
DROKASA S.A.
 Av. 28 de Julio 150
 Piso 7 - Miraflores
 Teléfono: 51(1) 219-3901

C[N+]1CCCCC1.[Cl-]

Titular del Registro: Serti S. A.

Mepiquat Chloride..... 50 g/L
Aditivos..... csp 1 L

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

Clodp!

CETOX: Tel. 273-2318; 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la
 solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice, triturándolo o
 perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales

PRIMOS AUXILIOS

Grupo químico: Amonio cuaternario

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

PRIMEROS AUXILIOS

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Aplicar en época de floración. Como máximo aplicar 2 veces /campaña, considerando una (01) campaña al año. El intervalo de aplicación se recomienda en 15 días.

No ingresa al área tratada antes de 12 horas de realizada la aplicación.

Clophi es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CLOPHI, es un regulador de crecimiento que se absorbe y trasloca a través de toda la planta. Actúa inhibiendo la síntesis del ácido giberélico de la planta, reduciendo el crecimiento vegetativo excesivo incluyendo el crecimiento, para forzar la maduración. En el algodón *interviene activamente en la fijación de botones, flores y bellotas.*

CLOPHI, se usa en pulverización foliar, empleando equipos de aplicación terrestre, previa calibración.

CULTIVO	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	L/Cil	L/ha		
Algodón	0,5 - 1,0	1,0 - 1,5	30	5

PC: Periodo de Carenia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

